



LÍNEA

AVES

GRUPO
D DROGAVET

 **Laboratorios
DROGAVET**



MISIÓN

Cuidamos la sanidad agro-veterinaria integrada a la salud de las personas, a través de la fabricación e innovación de productos con metodologías propias y únicas, altamente intensiva en investigación y desarrollo, respetuosos con las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, comunidad y medio ambiente.



VISIÓN

Ser líderes en ventas a nivel nacional e internacional, reconocidos como una empresa innovadora y competitiva, satisfaciendo las más altas exigencias de calidad y productividad de los clientes.

Comprometidos con la salud, la sanidad y
el bienestar de la **Producción animal**.



Innovación



Confiabilidad



Eficacia



Liderazgo



Compromiso



Responsabilidad
Social

COMPROMETIDOS CON **NUTRIR** UN MUNDO SIN FRONTERAS



Perú



Guatemala



Bolivia



Vietnam



El Salvador



Panamá



Nicaragua



Ecuador



Costa Rica



Colombia



República Dominicana



Honduras



Paraguay



Uruguay



Argentina



México

Índice

Antibióticos

09

Líquidos

AZ-Drog®	10
Broncox D® S.O.	10
Ciprodrog 20%®	11
Diaerom-N	11
Amoxidrog C-Plus®	12
Doxidrog 20®	12
Doxidrog L®	13
Enroflyn 10%®	13
Enroflyn 20%®	14
Fosfodrog® C	14
Fosfodrog® - L	15
Gatifloxadrog®	15
Levodrog®	16
Norflyn 20%	16
Norflyn 25%	17
Roxidrog	17
Sanadrog® S.O.	18
Sulfadrog®	18
Sulfamix® S.O.	19

Polvos

Amoxidrog C-Plus®	20
Bmdrog P	20
Broncox D®	21
Doxidrog-50®	21
Doxidrog C-Plus®	22
Dromoxil	22
Enroflyn P10	23
Florfenidrog L-2®	23
Florfenidrog®-F5	24
Fosfodrog-T®	24
Heat 4L®	25
Heat Plus®	25
Lincodrog-P®	26

Lincodrog-S®	26
Neomidrog 50®	27
Norflamox® RP	27
Norflamox®	28
Oxidrog-T	28
Oxidrog L	29
Sanadrog®	29
Sulfadit®	30
Sulfadit C®	30
Sulfadit D®	31
Sulfamix®	31
Sulfaquin-T	32
Tiamudrog®	32
Tilmicodrog® P	33
Tilodrog - P	33

Inyectables

Amoxides G L.A.®	34
Amoxides L.A.®	34
Broncox D Solución Inyectable®	35
Ceftidrog®	35
Ciprodrog INY®	36
Enrodrog®	36
Enrodrog®20	37
Fosfodrog T INY®	37
Gatifloxadrog INY®	38
Sulfadrog®-T Solución Inyectable	38
Sulfamix INY®	39

Expectorantes

40

Líquidos

Expectodrog®	41
Expectodrog®N	41
Expectodrog®Plus	42
Mucos-d®	42

Analgésico y Antipirético

43

Líquido

Aspidrog®S.O.	44
---------------	----

Polvo

Aspidrog®	44
-----------	----

Anticoccidiales

43

Líquidos

Dicladrog

45

Totral-K

45

Polvos

Coccidrog S

46

Dicladrog P

46

Coccidrog

47

Antidiarreico

43

Líquido

Diaerom-Plus

47

Control de moscas

43

Polvo

Larvadrog®

48

Pigmentante

43

Polvo

Ludrog A40

48

Antiparasitario

43

Polvo

Iverdrog-P

49

Iverdrog-P12

49

Naturales

50

Líquidos

EM-Drog

51

Inmunotox S.O.

51

Silydrog®

52

Citridrog L®

52

Polvos

EM-drog P

53

Inmunodrog® P

53

Silydrog®40

54

Inmunotox

54

Citridrog®

55

Desinfectantes

Líquidos

Glutaltek 1/3®

Glutaltek 2/3®

Glutaltek 2

Glutaltek F®

Vinadrog

Vitaminas

Líquidos

AK Stress®

Aminovitadrog

Chemi Stress RC® S.O

Chemi Stress® S.O.

Complivit B S.O.

Drogavit Plus®

Drovimix 5

Savimdrog®

Vitadrog B®

Polvos

Ak-Drog

Chemi Stress RC®

Chemi Stress®

Clor Vit H

Complivit B

Drogavit E®

Electress D®

Hepa Vit

Vita Vet Plus

Suplementos

Inyectables

Banemin B12

Drogavit B®

Vigordrog®

Anabólicos

Inyectables

Boldedrog®

56

57

57

58

58

59

59

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

71

71

72

73

74

ANTIBIÓTICOS

Líquidos

Polvos

Injectables



AZ-DROG®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Azitromicina dihidrato 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

AZ-DROG® está indicado para el control y tratamiento de infecciones del tracto respiratorio y problemas digestivos sensibles a la azitromicina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 1 mL de AZ-DROG® / 10 kg p.v. / día o 100 mg / kg p.v. por día, por 3 a 5 días.

Agua de bebida constante: 1 mL de AZ-DROG® / L de agua por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.



BRONCOX D®

SOLUCIÓN ORAL

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

BRONCOX D® Solución Oral está indicado en aves y porcinos.

Aves (pollos, gallinas y pavos): Infecciones por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*; E.R.C.

Síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral en el agua de bebida.

Tratamiento: 0.1 mL de BRONCOX D® Solución Oral / kg p.v. por día, o 1 litro de BRONCOX D® Solución Oral / 1000 litros de agua, durante 3 a 5 días.

Control de Micoplasma: Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante de 5 a 7 días por mes, a criterio del médico veterinario.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

CIPRODROG 20%®

Antibiótico de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Azitromicina dihidrato 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

CIPRODROG 20%® está indicado en aves y cerdos para el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano. Su espectro de acción comprende microorganismos como *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *Streptococcus* sp., *Salmonella* sp., *Staphylococcus* sp., *Escherichia coli*, *Avibacterium paragallinarum* (coriza infecciosa), *Pasteurella multocida* (cólera aviar).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 0.5 mL de **CIPRODROG 20%®** /L de agua o 1 mL de **CIPRODROG 20%®** / 20 kg p.v. / día, 3 – 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

DIAEROM-N

Antibiótico antidiarreico

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfato de Neomicina 150 g, Caolín 150 g, Pectina 4.4 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

DIAEROM-N está indicado para aves, porcinos, bovinos y equinos en el tratamiento de procesos diarreicos agudos de origen bacteriano producidos por cepas susceptibles de *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Klebsiella*, *Proteus*. Coadyuvante en el tratamiento de diarreas inespecíficas e intoxicaciones alimentarias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Pollos, gallinas, pavos, patos: Diluir 1 mL de **DIAEROM-N** por litro de agua de bebida constante, o también 0.1 mL de **DIAEROM-N** / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Pollos, gallinas, pavos, patos y lechones: 0 días

Huevos: 0 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



AMOXIDROG C-PLUS®

Combinación antibiótica de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidratada 200 g, Ciprofloxacina HCl 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

AMOXIDROG C-PLUS® está indicado en aves (pollos de engorde, pollitos, pollonas, pavos) y porcinos para el tratamiento y control de infecciones causadas por microorganismos como:

Gram positivas: *Mycoplasma spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium*, *Clostridium spp.*

Gram negativos: *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Avibacterium spp.*, *Bordetella spp.*, *Actinobacillus spp.*, ORT.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

0.65 mL de **AMOXIDROG C-PLUS®** / L de agua constante, 3 - 5 días, dependiendo de la severidad del proceso infeccioso.

PERIODO DE RETIRO

5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 1 L y 5 L.

DOXIDROG 20®

Antibiótico amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Doxicilina HCl 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram positivas y negativas (*Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Sphaerophorus necrophorus*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Actinomyces bovis*, *Leptospira pomona*, *Moraxella bovis*, *Erysipelothrix insidiosa*, *Corynebacterium spp.*, *Listeria spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*) y microorganismos de las familias *Chlamydiae*, *Mycoplasmataceae* y *Rickettsiaceae* (*Anaplasma spp.*).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 0.5 mL / litro de agua constante o 0.1 mL / kg p.v. / día, 3 - 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL y 1 L.

DOXIDROG L®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Doxiciclina Hiclato 105 g (Eq. a 100g de base), Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades causadas por *Badillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Bordetella spp.*, *Brucella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Yersinia spp.*, *Leptospira spp.*, *Actinomyces spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Salmonella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella multocida*, *Chlamydia psittaci*, también actúa contra algunos protozoos y rickettsias.

Presenta susceptibilidad variable frente a *Bacteroides spp.* y *Clostridium spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves (pollos, pavos, patos y gallos) y porcinos: 0.1 - 0.2 mL de DOXIDROG L® / kg p.v. / día, durante 3 - 5 días.

Considerar el consumo promedio de agua en aves de 1.5 - 2.0 veces el consumo de alimento, y en cerdos aproximadamente 2 - 3 veces el del alimento.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

ENROFLYN 10%®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

ENROFLYN 10%® indicado en porcicultura y avicultura (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Moraxella spp.*, *Serratia spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia spp.* y *Vibrio spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves: 1 mL de ENROFLYN 10%® / 10 kg p.v. (equivalente a 10 mg / kg p.v.); durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ENROFLYN 20%®

Antibiótico amplio espectro

Antibiótico - Líquido



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 200 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infecciones en aves y porcinos causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Moraxella spp.*, *Serratia spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia spp.* y *Vibrio spp.*

Tratamiento de las infecciones causadas por bacterias gram positivas y negativas sensibles a la enrofloxacin en perros y gatos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 1 mL de ENROFLYN 20%® / 20 kg p.v. (equivalente a 10 mg / kg p.v.); durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 8 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



FOSFODROG® C

Asociación antibiótica

Antibiótico - Líquido



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves: Colibacilosis, aerosaculitis, tifoidea aviar, coriza, E.R.C., y artritis bacteriana.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

1 mL de FOSFODROG® C / litro de agua constante o 1 mL de FOSFODROG® C / 10 kg p.v. el primer día, luego administrar 0.5 mL de FOSFODROG® C / litro de agua de bebida o 100 mg del producto por kg p.v. en dosis pulso por 3 a 5 días a criterio del médico veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.



FOSFODROG® L

Antibiótico

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves: Colibacilosis, septicemia, coriza infecciosa, síndrome de cabeza hinchada, onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar y artritis bacteriana.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 1 mL de FOSFODROG® L / litro de agua el primer día, posteriormente 0.5 mL de FOSFODROG® L / litro de agua constante por 3 a 5 días o 1 mL de FOSFODROG® L / 10 kg p.v., por día (correspondiente a 10 mg de fosfomicina / kg p.v.), durante 3 a 5 días consecutivos.

PERIODO DE RETIRO

Huevo: 24 horas.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



GATIFLOXADROG®

Fluoroquinolona de quinta generación

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Gatifloxacina 80 g, Vehículo c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES

GATIFLOXADROG® está indicado en aves y porcinos para el tratamiento de micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, aerosaculitis, septicemias, coriza infecciosa, ORT, pasteurelisis, colibacilosis, cólera aviar, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis e infecciones urogenitales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 1 mL de GATIFLOXADROG® / litro de agua de bebida constante o 1 mL de GATIFLOXADROG® / 10 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



LEVODROG®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Levofloxacin 100 g, Vehículo c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES

Aves: Tratamiento de E.R.C., sinovitis infecciosa, coriza infecciosa y clamidiosis en pavos. Infecciones por *Pseudomona spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.* En casos de colibacilosis, enteritis necrótica, dermatitis gangrenosa, botulismo y cólera aviar.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida:

Aves:

- **Dosis pulso:** 100 mg de **LEVODROG®** / kg p.v. por 2 a 3 horas / día, por 3 a 5 días según gravedad.
- **Dosis continua:** 1 mL de **LEVODROG®** / 10 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días en agua de bebida constante.

Para la administración de **LEVODROG®** considerar una ingesta de agua diaria de 1.6 – 2 veces más en relación al consumo promedio de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

NORFLYN 20%

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Indicado en aves y porcinos para el tratamiento y control de infecciones causadas por *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomona spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*

Aves (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos): brotes moderados de enfermedad crónica respiratoria.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves (Pollos, gallinas y pavos): Tratamiento y prevención: 60 mL de **NORFLYN 20%** / 100 litros de agua constante o 1 mL de **NORFLYN 20%** / 16 kg p.v./ día (equivalente a 12 mg de norfloxacin / kg p.v.), durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



NORFLYN 25%

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Norfloroxacina 250 g, Vehículo c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infecciones causadas por microorganismos como *Mycoplasma* sp., *Haemophilus* sp., *Pasteurella* sp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* sp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Aves:

- 0.5 mL de NORFLYN 25% / litro de agua de bebida constante, o
- 1 mL de NORFLYN 25 % / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

TILMICODROG®

Antibiótico eficaz en enfermedades respiratorias

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Tilmicosina fosfato 250 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves (Broilers, levante de ponedoras, pavos): Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias en aves asociadas con *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*, y otros gérmenes sensibles a la tilmicosina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Aves:

- **Broilers y Levante de pollitas:** 0.6 a 0.8 mL / 10 kg p.v. (equivalente a 15 a 20 mg/kg de tilmicosina) o 0.4 mL / litro de agua de bebida constante o por tres días.
- **Pollos bebe:** 0.8 mL / 100 kg p.v. durante los primeros 3 días de vida (equivalente a 2 mg/kg p.v. de tilmicosina).
- **Pavos:** 0.4 a 1.08 mL / 10 kg p.v. (equivalente a 10 a 27 mg/kg de tilmicosina) o 0.2 a 0.5 mL / litro de agua de bebida por tres días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 12 días.

Pavos: 19 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ROXIDROG

Antibiótico antidiarreico

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Roxitromicina 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

ROXIDROG está indicado para el tratamiento y control de infecciones del tracto respiratorio y problemas digestivos sensibles a la roxitromicina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 1 mL de ROXIDROG / 10 kg p.v. por día o 10 mg / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

No administrar en animales productores de huevo para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



SANADROG® S.O.

Combinación antibiótica

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Roxitromicina 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

SANADROG® S.O. está indicado para aves:

Tratamiento de la Enfermedad Crónica Respiratoria (*Mycoplasma gallisepticum*) y en infecciones causadas por *Mycoplasma Sinoviae* complicada por la presencia de *Escherichia coli*. En infecciones respiratorias producidas por Cólera aviar (*Pasteurella multocida*), Coriza infecciosa (*Avibacterium paragallinarum*) y en la coriza de los pavos (*Bordetella avium*). Además en enteritis causada por *Clostridium* sp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

— **Tratamiento:** 1 litro de SANADROG® S.O. por 1000 litros de agua, durante 5 días; o 0.1 mL de SANADROG® S.O. / kg p.v. por día por 5 días.

— **Control sde Micoplasma:** Se recomienda administrar la dosis de tratamiento 1 semana por mes, a criterio del médico veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

SULFADROG®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfametoxazol 200 g, Trimetoprim 40 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves: Coriza infecciosa, cólera aviar, E.R.C., colibacilosis, tífosis aviar, neumonías, onfalitis, estreptococosis y coccidiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

0.5 mL de **SULFADROG®** / litro de agua constante, durante 3 a 5 días.

En casos severos: 1 mL **SULFADROG®** / litro de agua, o 1 mL **SULFADROG®** / 10 a 20 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días, según criterio del médico veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



SULFAMIX® S.O.

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 150 g, Sulfadiazina sódica 150 g, Trimetoprim 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, salmonelosis, coccidiosis, pasteurellosis, cólera aviar, colisepticemia y cresta azul.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

1 mL de **SULFAMIX® S.O.** / 10 kg p.v. / día o

100 mg de **SULFAMIX® S.O.** / kg p.v. / día o

1 mL **SULFAMIX® S.O.** / litro de agua de bebida constante, por 3 – 5 días.

Casos severos: Se puede duplicar la dosis por 1 a 2 días y continuar con la recomendada hasta completar el tratamiento por 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL y 1 L.



AMOXIDROG C-PLUS®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfametoxazol 200 g, Trimetoprima 40 g, Vehículo c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Pollo: En infecciones respiratorias producidas por *Coriza infecciosa (Avibacterium paragallinarum)*, Cólera aviar (*Pasteurella multocida*), Enfermedades Respiratorias Crónicas, Colibacilosis y en la coriza de los pavos (*Bordetella avium*). Además en enteritis causada por *Clostridium* sp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 0.5 mL / litro de agua constante o 0.1 mL / kg p.v. / día, 3 – 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.

BMDROG P®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Bacitracina metileno disalicilato 110 g, Excipiente c.s.p 1000 g.
(1 g de BMD equivale a 42 000 U de bacitracina).

INDICACIONES

Indicado en aves (pollos, gallinas, pavos) y porcinos como:

- Promotor de crecimiento: mejora de ganancia de peso, optimiza la conversión alimenticia, mejora el crecimiento e incremento en la producción de huevos en gallinas de postura.
- Prevención y control de enteritis causada por *Clostridium perfringens*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Promotor de crecimiento:

- Pollos de engorde: 250 g de **BMDROG P / T**, en forma continua.
- Pavos: 500 g de **BMDROG P / T**, en forma continua.
- Gallinas: 270 g de **BMDROG P / T**, en forma continua.

Promotor de crecimiento y prevención de enteritis necrótica:

- Pollos de engorde: 500 g de **BMDROG P / T**, en forma continua.

Tratamiento y control de enteritis necrótica:

- Pollos de engorde: 1 - 2 kg de **BMDROG P / T**, por 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne y huevo: 0 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.





BRONCOX D®

Antibiótico amplio espectro



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

BRONCOX D® es eficaz contra infecciones en aves causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *M. sinoviae*, *M. meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, clostridiosis. En porcinos, actúa frente a neumonía enzoótica, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; *Erysipelothrix rhusiopathiae*, rinitis atrofica, disentería porcina y artritis por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

- Agua de bebida: 100 mg de BRONCOX D®/kg p.v./día, por 3 a 5 días o 1 kg de BRONCOX D®/1000 L por 3 a 5 días (preparación diaria).
- Alimento: 2 kg de BRONCOX D®/T por 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves (pollos, gallinas y pavos): 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



DOXIDROG-50®

Antibiótico amplio espectro



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Doxiciclina HCl 500 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Aves: Enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum* y complicada por la presencia de *Escherichia coli*. Casos de colibacilosis, sinovitis infecciosa, cólera y cresta azul.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral según corresponda.

Aves:

- Agua de bebida: 0.4 g / L de agua, o 40 mg / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.
- Alimento: 800 g / T, durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

No administrar en animales productores de huevo o leche para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, y 20 kg.



DOXIDROG C-PLUS®

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Doxiciclina 200 g, Ciprofloxacina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

DOXIDROG C-PLUS® está indicado en el tratamiento de enfermedad respiratoria crónica, micoplasma, colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul, cólera aviar, colisepticemia, coriza contagiosa, pasteurelosis, pseudomoniasis, salmonelosis, infecciones por estafilococos y *Erysipelothrix* sp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves:

50 – 100 mg de DOXIDROG C-PLUS® / kg p.v. / día durante 3 a 5 días.

1 kg de DOXIDROG C-PLUS® / 1000 litros de agua constante durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

No administrar en animales productores de huevo o leche para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10, 100 g, 1 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



DROMOXIL

Antibiótico amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

DROMOXIL está indicado en aves y porcinos para el tratamiento de la salmonelosis, colibacilosis, coriza infecciosa, enfermedad respiratoria crónica, artritis bacteriana, pasteurelosis y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Aves: 42 mg / kg p.v. / día, 3 - 5 días, o 1 g / 24 kg p.v. / día, u 84 g / 200 L de agua de bebida constante.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.



ENROFLYN P10

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

ENROFLYN P10 está indicado en porcicultura y avicultura (pollos, patos y pavos de engorde, pollitas de postura en recria y reproductoras) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Erysipelotrix spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Moraxella spp.*, *Serratia spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia spp.* y *Vibrio spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Aves: 1 g de ENROFLYN P10 / 10 kg p.v. / 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Pollos: 10 días.

Pavos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



FLORFENIDROG L-2®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Florfenicol 20 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

FLORFENIDROG L-2® está indicado en aves y porcinos para el control y tratamiento de infecciones causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos, como *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinobacillus sp.* y *Mycoplasma spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado en el alimento.

Promotor de Crecimiento: 41 a 2 kg de FLORFENIDROG L-2® / tonelada, en forma constante.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 24 horas.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



FLOFENIDROG®-F5

Combinación antibiótica

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Florfenicol 50 g, Fosfomicina 50 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

FLOFENIDROG®-F5 está indicado en aves y porcinos contra gérmenes sensibles a la Fosfomicina y al Florfenicol como la *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Mycoplasma spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

En alimento como:

Promotor de Crecimiento: 0.5 a 1 kg **FLOFENIDROG®-F5** / tonelada de alimento en forma constante.

Control: 1 a 2kg **FLOFENIDROG®-F5** / tonelada de alimento durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



FOSFODROG-T®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g
(Equivalente a 97 g de fosfomicina base),
Trimetoprim 25 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Aves (pollos de engorde, pollas de reemplazo y reproductoras): Tratamiento de coriza infecciosa, colibacilosis, aerosaculitis, tifoidea aviar, cólera aviar, enfermedad respiratoria crónica y artritis bacteriana.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Agua de bebida: Preparación diaria, durante 3 a 5 días. 100 mg de **FOSFODROG-T®** / kg p.v. por día o 1 g de **FOSFODROG-T®** / litro de agua.

Alimento: 2 kg de **FOSFODROG-T®** / tonelada, durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



HEAT 4L®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfamonometoxina sodica 800 g, Trimetoprim 200 g.

INDICACIONES

Aves: Coccidiosis (Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria máxima, Eimeria brunetti), coriza infecciosa (Avibacterium paragallinarum), E.R.C. (Mycoplasma gallisepticum), estafilococosis (Staphylococcus aureus), pullorosis (Salmonella pullorum), colibacilosis (Escherichia coli).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida o en el alimento.

Aves (pollos, gallinas, pavos): 40 a 50 g de HEAT 4L® / 200 litros de agua de bebida constante o 20 a 25 mg de HEAT 4L® / kg p.v. por día, durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



HEAT PLUS®

Antibacteriano, coccidicida y broncosecretolítico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfamonometoxina sódica 700 g, Trimetoprim 200 g, Bromhexina 100 g

INDICACIONES

Aves: Coccidiosis, coriza infecciosa, pasteurelosis, enfermedad respiratoria crónica (E.R.C.), estafilococosis, bronquitis infecciosa, pullorosis y colibacilosis.

Bovinos: Neumonía bacteriana, colibacilosis y coccidiosis.

Porcinos: Colibacilosis, rinitis atrófica y toxoplasmosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Aves: 50 g de HEAT PLUS® / 200 L de agua, durante 5 días.

Bovinos y porcinos: En el agua, leche o ración diaria: 15 - 20 mg de HEAT PLUS® / kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días.

En el alimento: 300 - 500 g de HEAT PLUS® / T, durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



LINCODROG-P®

Antibiótico



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 110 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Promotor: Para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimentaria.

Tratamiento: En aves tiene acción predominante contra *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium spp.* En porcinos para el control y tratamiento de disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Pollos de engorde:

• **Enteritis necrótica:** Tratamiento: 1 kg/T de alimento por 7-10 días. Prevención: 20 g/T de alimento de forma continua.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



LINCODROG-S®

Antibiótico



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 44 g (Eq. a 40 g de base), Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Pollos de engorde: Tiene acción sobre *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium perfringens*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Pollos de engorde:

• Control de enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens* y otros microorganismos sensibles: 50 g de **LINCODROG-S®** / tonelada de alimento de forma continua (eq. a 2ppm de lincomicina base).

PERIODO DE RETIRO

Pollos de engorde: 0 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



NEOMIDROG-50®

Antibiótico de rápida acción



 **Antibiótico** - Polvo

COMPOSICIÓN

Sulfato de neomicina 500 g,
Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de enteritis bacterianas sensibles a la neomicina, principalmente causadas por *Escherichia coli*.

Aves: Diarreas inespecíficas y salmonelosis

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en alimento o agua de bebida.

Pollos de engorde:

• Tratamiento: 300 - 500 g de **NEOMIDROG 50®** / T de alimento ó 0.3 a 0.5 g de **NEOMIDROG 50®** / litro de agua de bebida (equivalente a 30 - 50 mg de **NEOMIDROG 50®** / kg p.v.), durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



NORFLAMOX®

Asociación antibiótica

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 200 g, Amoxicilina 100 g,
Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas complicadas, micoplasmosis, colibacilosis, salmonelosis y coriza infecciosa.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Aves: 100 - 200 mg de **NORFLAMOX®** / kg p.v. o 1 - 2 g de **NORFLAMOX®** / L de agua de bebida constante.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 14 días.

No administrar en animales productores de huevo para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.



NORFLAMOX® RP

Asociación antibiótica



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 120 g, Amoxicilina 150 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas complicadas, micoplasmosis, colibacilosis, salmonelosis y coriza infecciosa.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Aves:

- **Promotor de crecimiento y producción:** 300 g de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento en forma continua.
- **Control de reacciones postvacunales:** 500 g de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento, durante 3 a 5 días.
- **Tratamiento:** 1 kg de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



Asociación de amplio espectro



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina base 200 g, Lincomicina HCl 44 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

Aves: Es sumamente útil contra la enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma* spp. y complicada por la presencia de *Escherichia coli*. También se puede utilizar en colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul, síndromes respiratorios, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves:

Prevención y control: 0.5 kg de OXIDROG L / T de alimento en forma continua.

Tratamiento: 1 – 2 kg de OXIDROG L / T de alimento, durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

OXIDROG-T

Combinación antibiótica de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Oxitetraciclina 100 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

OXIDROG-T es eficaz contra infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves y Porcinos:

Tratamiento:

Agua de bebida:

200 mg de OXIDROG-T / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días consecutivos o 2 kg de OXIDROG-T / 1 000 litros de agua continua, durante 3 o 5 días (preparación diaria) o a criterio del médico veterinario responsable.

Control:

En el alimento:

2 kg de OXIDROG-T / tonelada, durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.

SANADROG®

Control de micoplasma y problemas respiratorios

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 150 g, Doxiciclina Hcl 100 g, Excipiente c.s.p 1000 g.

INDICACIONES

SANADROG® es eficaz contra infecciones por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua o en el alimento.

Aves:

Tratamiento:

Agua de bebida: 100 a 200 mg de SANADROG® / kg p.v., por día, durante 5 días consecutivos, o 1 a 2 kg de SANADROG® / 1 000 litros de agua continua, preparación diaria, durante 5 días consecutivos.

Dosificación, según gravedad, a criterio del médico veterinario responsable.

Alimento: 2 kg de SANADROG® / tonelada.

Control de Mycoplasma: Se recomienda dar la dosis indicada 1 semana por cada mes según sea el caso, a criterio del médico veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



SULFADIT®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfamonometoxina sódica. 400 g, Sulfadimetoxina sódica 200 g, Sulfadiazina sódica 200, Trimetoprim 200.

INDICACIONES

En aves (pollos, gallinas, pavos): Cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, enfermedades respiratorias crónicas, coriza infecciosa coccidiosis y colisepticemia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua o en el alimento.

Promotor de crecimiento: 30 g **SULFADIT®** / 200 litros de agua durante 3 a 5 días.

Dosis Terapéutica:

En el agua: 50 g **SULFADIT®** / 200 litros de agua durante 3 a 5 días.

En el alimento: 300 - 400 g **SULFADIT®** / tonelada, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



SULFADIT C®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 600 g, Sulfaclopiridazina 200 g, Trimetoprim 200 g.

INDICACIONES

Aves (pollos, gallinas y pavos): Síndrome de cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, E.R.C., coriza infecciosa, coccidiosis y colisepticemia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral según corresponda:

Alimento: 30 - 40 mg de **SULFADIT C®** / kg p.v. / día.

Agua de bebida: 75 - 100 g de **SULFADIT C®** / 200 L de agua durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Carnes: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.



SULFADIT D®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 800 g, Trimetoprim 200 g.

INDICACIONES

Aves: Cabeza hinchada, cólera aviar, tífosis aviar, enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, coccidiosis y colisepticemia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral en el agua de bebida o en el alimento.

Promotor de crecimiento:

30 g de **SULFADIT D®** / 200 litros de agua durante 3 a 5 días o 20 mg **SULFADIT D®** / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.

Terapéutico:

En el agua: 50 g **SULFADIT D®** / 200 litros de agua durante 3 a 5 días o 30 mg **SULFADIT D®** / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.

En el alimento: 300 a 400 g **SULFADIT D®** / tonelada, durante 5 a 7 días o 30 mg **SULFADIT D®** / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

No administrar en animales productores de huevos y leche para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



SULFAMIX®

Antibacteriano de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 300 g, Sulfadiazina sódica 300 g, Trimetoprim 150 g, Bromhexina HCl 100, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Aves (Pollos, gallinas, pavos, patos): Enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, salmonelosis, coccidiosis, pasteurelosis, cólera aviar y colisepticemia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento o agua de bebida.

Aves (Pollos, gallinas, pavos, patos): 32 mg de **SULFAMIX®** / kg p.v. / día, 5 - 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



SULFAQUIN-T

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfaquinoxalina 800 g, Trimetoprim 200 g.

INDICACIONES

SULFAQUIN -T está indicado en aves, porcinos, terneros y conejos, para la prevención y tratamiento de coccidiosis, casos de colibacilosis, salmonelosis y cólera aviar.

Actúa frente a *Eimeria* spp. (*E. necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima*, *E. tenella*, *E. stiedae*, *E. magna*, *E. irresidua*, *E. media*, *E. perforans*, *E. flavescentes* y *E. intestinalis*), *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. y *Pasteurella multocida*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Aves (pollos y pavos): 50 a 70 g de **SULFAQUIN -T** / 200 litros de agua o 500 a 700 g de **SULFAQUIN -T** / tonelada de alimento, durante 3 días.

Suspender 2 días y repetir el tratamiento según evaluación del médico veterinario.

PERIODO DE RETIRO

10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



TIAMUDROG®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Fumarato hidrogenado de tiamulina 200 g.

Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Aves: Infecciones por *M. gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *M. hyopneumoniae*, *Brachyspira hyodysenteriae*, gram positivos: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium perfringens*, *Cornebacterium pyogenes*, gram negativos: *Pasteurella* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus* spp., *Escherichia coli*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral según corresponda.

Aves:

• **Alimento:**

Promotor: 300 a 400 g de **TIAMUDROG®** / T, en forma continua.

Terapéutico: 1.5 a 2.5 kg de **TIAMUDROG®** / T, durante 5 a 7 días.

• **Agua de bebida:**

Terapéutico: 75 a 125 mg **TIAMUDROG®** / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.

GRUPO PROGAVEL



TILMICODROG® P

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilmicosina fosfato 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

TILMICODROG® P está indicado en aves (pollos de engorde, levante de ponedoras, pavos) y porcinos.

Aves: Tratamiento y control de infecciones respiratorias asociadas con *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*; y otros.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral, en el alimento.

1 a 2 kg de **TILMICODROG® P** por tonelada de alimento.

PERIODO DE RETIRO

- Pollos: 12 días

- Pavos: 19 días

No administrar a gallinas en producción de huevos destinado a consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



TILODROG-P

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Fosfato de tilosina 100 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Para la prevención y control de la ERC, disentería porcina y abscesos hepáticos. Recomendado también como promotor de crecimiento y de postura y mejora la conversión alimenticia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado en el alimento.

Aves (pollos, gallinas y pavos):

• **Promotor de crecimiento:** 0.5 kg de **TILODROG-P** / T, de forma continua.

• **Promotor de producción:** 0.25 – 0.55 kg de **TILODROG-P** / T, de forma continua.

• **Prevención y control:** 2 – 5 kg de **TILODROG-P** / T, durante 5 – 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves (Pollos, pavos y gallinas): 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.



AMOXIDES L.A.®

Antibiótico + antiinflamatorio

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Amoxicilina Trihidratada 10 g, Estreptomicina Sulfato 10 g, Dexametasona Fosfato 0.15 g, Excipiente c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves: Colisepticemia, colibacilosis, E.R.C., salmonelosis, clostridiosis, coriza infecciosa, pasteurelosis y septicemias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar 1 mL de AMOXIDES L.A.® / 10 kg p.v. En todas las etapas productivas.

Aves: Vía subcutánea.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

Huevo: No usar en animales cuyos huevos sean destinados para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



AMOXIDES G L.A.®

Antibiótico - antiinflamatorio

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidratada 15 g, Gentamicina sulfato 4 g, Dexametasona Fosfato 0.15 g, Excipiente c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Aves: Colisepticemia, colibacilosis, E.R.C., salmonelosis, clostridiosis, coriza infecciosa, pasteurelosis, septicemias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

1 mL de AMOXIDES G L.A.® / 10 kg p.v. De ser necesario repetir a las 48 horas.

Aves: Vía subcutánea.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 25 días.

Huevo: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

BRONCOX D®

SOLUCIÓN INYECTABLE

Combinación antibiótica de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 5 g, Doxiciclina 20 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Tratamiento de ERC, neumonías, pleuroneumonías, agalactia contagiosa, pododermatitis, artritis, micoplasmosis, erisipela porcina, disentería porcina, coriza infecciosa y cólera aviar.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular y subcutánea.

Aves (pollos, gallinas y pavos): 1 mL / 10 kg p.v. / día, por 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves (pollos, gallinas y pavos): 5 días;

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

CEFTIDROG®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ceftiofur sódico 50 mg, Vehículo c.s.p 1 mL.

INDICACIONES

CEFTIDROG® está indicado en infecciones del sistema respiratorio, urinario, óseo, piel y tejido blando, asociados a microorganismos susceptibles. Casos de Fiebre del embarque, neumonías, pododermatitis, metritis aguda, mastitis; y para la reducción de la mortalidad temprana en pollito o pavo bebé.

Pollos y pavos: Indicado en la reducción de la mortalidad temprana en pollito o pavo de 1 día de edad (infecciones colibacilares y estafilocócicas), asociada a variedades de *E. coli* sensibles al ceftiofur.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular y subcutánea.

Aves (pollos, gallinas y pavos): 1 mL / 10 kg p.v. / día, por 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



CIPRODROG INY®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ciprofloxacina HCl 7.5 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, urogenitales y de la piel.

Aves: Aves: síndromes respiratorios, coliseptisemia, y coriza.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular y subcutánea.

Pollos: 1mL / 15 kg p.v. por 3 a 5 días vía IM.

PERIODO DE RETIRO

Pollos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



ENRODROG®

Fluoroquinolona de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 10 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

ENRODROG® está indicado en:

Aves: infecciones respiratorias (pasteurelosis, micoplasmosis, coriza infecciosa, sinusitis infecciosa) e infecciosas entéricas (salmonelosis, colibacilosis, erisipela, cólera aviar). Es una buena elección terapéutica el uso de la enrofloxacin en infecciones experimentales causadas por *E. coli*, *S. typhimurium*, *S. gallinarum*, *S. anzonae*, *S. pullorum*, *H. paragallinarum*, *P. multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*; y también en infecciones naturales por *E. coli*, *M. gallisepticum* y asociadas a *E. coli* y *Mycoplasma sp.* Asimismo, es eficaz en la profilaxis y tratamientos de diversas especies de aves con psitacosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular y subcutánea.

Aves(pollos y pavos): 1 mL de ENRODROG® / 10 kg p.v. / 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Pavos: 28 días.

Pollos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ENRODROG® 20

Fluoroquinolona de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 20 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Aves (pollos, pollitas de reemplazo y pavos): Tratamiento de ERC, coriza, micoplasmosis, cólera, salmonelosis, colisepticemia y estafilococosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves (pollos, pollitas de reemplazo y pavos): 1 mL / 20 kg p.v. / 3 días, vía SC (equivalente a 10 mg p.a. / kg p.v.).

PERIODO DE RETIRO

Carne: 7 días.

Pavos: 10 días.

No administrar en animales productores de huevo y leche para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



FOSFODROG T INY®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 10 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Aves: Coriza infecciosa, cólera aviar, colibacilosis, ORT, ERC, estafilococosis, tifoidea aviar, clamidiosis y onfalitis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: 1 mL de FOSFODROG T INY® / 10 kg p.v. / día, 3 - 5 días por vía SC.

PERIODO DE RETIRO

Huevos: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



GATIFLOXADROG INY®

Fluoroquinolona de cuarta generación



Antibiótico - Inyectable



COMPOSICIÓN

Gatifloxacina 8 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Para el tratamiento de micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, aerosaculitis, septicemias, coriza infecciosa, ORT, pasteurelisis, colibacilosis, cólera aviar, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis e infecciones urogenitales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía subcutánea.

Aves (pollos, pavos y patos): 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 15 kg p.v. por día, durante 3 días (equivalente a 5 mg de gatifloxacina / kg p.v.).

PERIODO DE RETIRO

7 días.

No administrar en animales productores de huevo destinados para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



SULFADROG®-T

Antibacteriano de amplio espectro



Antibiótico - Inyectable



COMPOSICIÓN

Sulfadiazina sódica 400 mL, Trimetoprima 80 mL, Vehículo c.s.p 1 mL.

INDICACIONES

En infecciones respiratorias bacterianas (rinitis, bronquitis, bronconeumonías y neumonías); urogenitales (metritis, vaginitis, nefritis); infecciones digestivas (disenteria, colibacilosis, salmonelosis, coccidiosis, enteritis y peritonitis); infecciones en general (mastitis, dermatosis, queratitis infecciosa, necrobacilosis oral, pododermatitis infecciosa, actinomicosis y actinobacilosis); período postquirúrgico y postparto.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves (pollos y pavos) y porcinos: 0.05 - 0.1 mL / kg p.v. / día por 3 - 5 días, vía IM o EV.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

SULFAMIX INY®

Antibacteriano de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sodica 15 g, Sulfadiazina sodica 15 g, Trimetoprim 6 g, Vehículo c.s.p 100 mL.

INDICACIONES

Aves (pollos, gallinas, pavos, avestruces): Enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, salmonelosis, coccidiosis, pasteurelosis, cólera aviar, colisepticemia, cresta azul.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: Vía SC, 1 mL de SULFAMIX INY® /10 kg p.v. por día, durante 1 a 2 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 25 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

EXPECTORANTES

Líquidos



ESPECTODROG® PLUS

Expectorante, mucolítico
y antihistamínico

💧 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina clorhidrato 5 g, Eucaliptol 10 g, Clorfeniramina maleato 10 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Tratamiento de síndromes respiratorios, enfermedades respiratorias, como coadyuvante en tratamiento con antibióticos, reacciones post vacunales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida (en todas las etapas productivas):

Aves: 0.25 mL a 0.5 mL / litro de agua, por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

No debe ser administrado en animales productores de huevos para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



MUCOX-D®

Expectorante mucolítico

💧 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Guaifenesina 250 g, Eucaliptol 20 g, Ácido acético 80 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Presencia de exudados en el tracto respiratorio causado por enfermedades respiratorias.

Aves: Tratamiento coadyuvante en casos de coriza, bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, micoplasmosis, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*), cólera aviar y síndromes respiratorios.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida (en todas las etapas productivas):

Aves: 0.25 mL a 0.5 mL / litro de agua, por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

No debe ser administrado en animales productores de huevos para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ESPECTODROG®

Expectorante mucolítico

 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina clorhidrato 5 g, Eucaliptol 10 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Tratamiento de síndromes respiratorios, enfermedades respiratorias como coadyuvante en tratamiento con antibióticos y reacciones post vacunales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: En todas las etapas productivas.

Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 0.25 mL a 0.5 mL / L de agua, por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

No debe ser administrado en animales productores de huevos para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ESPECTODROG® N

Expectorante mucolítico

 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina clorhidrato 5 g, Guaifenesina 30 g, Eucaliptol 80 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Se indica en bovinos, porcinos, aves, caninos y felinos, sólo o en combinación con antibióticos, contra enfermedades o síndromes respiratorios en los que el daño del aparato mucociliar degenera en la producción excesiva de moco viscoso la tos crónica en equinos, bronconeumonía en bovinos y la bronquitis crónica en perros son algunos ejemplos que motivan su prescripción médica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: En todas las etapas productivas.

Nebulización:

Usar 250 a 500 mL de ESPECTODROG®N por mochila de agua de 20 litros durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 0.25 mL a 0.5 mL / L de agua, por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



**ANALGÉSICO Y
ANTIPIRÉTICO**

ANTICOCCIDIAL

ANTIDIARREICO

**CONTROL DE
MOSCAS**

PIGMENTANTE

ANTIPARASITARIO



ASPIDROG® S.O.

Analgésico y antipirético

 **Analgésico y antipirético** - Líquido



COMPOSICIÓN

Paracetamol 250 g, Metamizol 50 g, Ácido ascórbico 25 g, Vitamina A 3 g, Vehículos c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Tratamiento de síntomas febriles y dolencias de diversas patologías. Terapia de soporte en afecciones bacterianas o virales, estrés por calor y aglomeraciones por transporte o hacinamiento.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves (pollos de engorde y gallinas en etapa de levante): 0.5 mL de ASPIDROG® S.O. / L / día, hasta que cesen los síntomas o a criterio del Médico Veterinario tratante.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



ASPIDROG®

Analgésico y antipirético

 **Analgésico y antipirético** - Polvo



COMPOSICIÓN

Paracetamol 250 g, Metamizol 50 g, Ácido ascórbico 25 g, Vitamina A 3 g, Vehículos c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Tratamiento de síntomas febriles, dolencias e inflamaciones de diversas patologías.

Terapia de soporte en afecciones bacterianas o virales, estrés por calor y aglomeraciones por transporte o hacinamiento.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Aves (pollos de engorde y gallinas en etapa de levante): 0.5 g de ASPIDROG® / L / día, hasta que cesen los síntomas o a criterio del Médico Veterinario tratante.

Porcinos, bovinos, ovinos y caprinos: 0.75 g de ASPIDROG® / 10 kg p.v. 2 veces al día, hasta que cesen los síntomas o a criterio del Médico Veterinario tratante.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 2 días.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.





DICLADROG

Anticoccidial

💧 **Anticoccidial** - Líquido



COMPOSICIÓN

Diclazuril 10 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

DICLADROG está indicado en pollos de engorde, aves de postura y pavos, para la prevención de coccidiosis en pollos de engorde, aves de postura y pavos, causadas por *E. tenella*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. burnetti*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. mitis*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral, en el agua de bebida.

- 250 mL de **DICLADROG** para 1000 litros de agua constante, debiéndose ajustar esta dosis de acuerdo a las variaciones estacionales del consumo de agua.
- Casos severos 500 mL de **DICLADROG** para 1000 litros de agua de bebida.

PERIODO DE RETIRO

Carne y Huevo: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



TOTRAL K

Anticoccidial

💧 **Anticoccidial** - Líquido



COMPOSICIÓN

Toitrazuril 25 g, Vitamina K₃ 3 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Está indicado en pollos de engorde, pavos, levante de ponedoras y reproductoras para el tratamiento y control de coccidiosis causadas por *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. mitis* y *E. tenella*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral, en el agua de bebida.

Pollos de engorde, pavos, levante de ponedoras y reproductoras:

1 mL / L / 48 horas o 3 mL / L / 8 horas al día por 2 días consecutivos.

PERIODO DE RETIRO

Pollos: 14 días.

Pavos: 16 días.

No administrar en animales productores de huevos destinados para el consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



COCCIDROG

Anticoccidial

 **Anticoccidial** - Polvo



COMPOSICIÓN

Amprolio 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Tratamiento y control de coccidiosis en pollos, aves de postura, reproductoras y pavos, producida por *Eimeria tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Tratamiento: 1 g de **COCCIDROG** / L de agua de bebida constante por 7 días.

Preventiva: 0.3 g de **COCCIDROG** / L de agua de bebida constante por 7 días.

PERIODO DE RETIRO

COCCIDROG tiene un amplio margen de seguridad sin efectos adversos en fertilidad, incubabilidad, calidad del huevo y productividad.

Carne y huevo: 6 horas.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



DIAEROM-PLUS

Antidiarreico no antibiótico

 **Antidiarreico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Caolín 200 g, Pectina 4.4 g, Esencia de anís 2.0 g, Agua desionizada c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

DIAEROM-PLUS está indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis inespecíficas de los animales. Puede administrarse solo o como coadyuvante en el tratamiento con antibióticos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

Aves (pollos, gallinas y pavos): 1 mL de **DIAEROM-PLUS** / litro de agua durante 3 a 5 días continuos, a criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO

No requiere.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



COCCIDROG S

Anticoccidial de amplio espectro

 **Anticoccidial** - Polvo



COMPOSICIÓN

Amprolio 200 g, Sulfaquinoxalina 200 g, Excipiente c.s.p: 1000 g.

INDICACIONES

Indicado para la prevención y tratamiento de la coccidiosis en pollos, gallinas y pavos, ocasionadas por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti*. Proporciona mayor eficacia en el control de brotes de especies mixtas de coccidias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

0.5 g de **COCCIDROG S** / L de agua de bebida / 7 días consecutivos.

PERIODO DE RETIRO

COCCIDROG S tiene un amplio margen de seguridad sin efectos adversos en fertilidad, incubabilidad, calidad del huevo y productividad.

Carne y huevo: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



DICLADROG P

Anticoccidial

 **Anticoccidial** - Polvo



COMPOSICIÓN

Diclazuril 10 g, Excipiente c.s.p: 1000 g

INDICACIONES

DICLADROG P está indicado en pollos de engorde, levante de ponedoras y pavos, para la prevención de coccidiosis, la cual es causada por los siguientes microorganismos: *E. tenella*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. acervulina*, *E. maxima* y *E. mitis*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral, en el alimento:

Aves: 100 g de **DICLADROG P** / tonelada de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



LARVADROG®

Aditivo alimenticio para el control de moscas y pulgas



 **Control de moscas** - Polvo

COMPOSICIÓN

Ciromazina 100 g, Aerosil 20 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Control y exterminio de larvas, moscas y pulgas en la cama de las gallinas ponedoras, comerciales y reproductoras.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

50 g de LARVADROG® / tonelada (5ppm) durante seis semanas seguidas. Suspender por el mismo lapso de tiempo y repetir este proceso de manera sucesiva.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.



LUDROG A40

Aditivo pigmentante

 **Pigmentante** - Polvo



COMPOSICIÓN

Xantofilas amarillas 40 g, Excipientes 1000 g

INDICACIONES

LUDROG A40 está indicado para lograr un atractivo color amarillo en la piel del pollo de engorde, así como un matiz amarillo anaranjado en la yema del huevo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

- **Pollo de engorde:** 0.1 a 1 kg de LUDROG A40 por tonelada.
- **Gallinas de postura:** 0.05 a 0.75 kg de LUDROG A40 por tonelada.

La dosificación depende del grado de color o tonalidad que se desea obtener y del nivel de xantofilas presente en la fórmula alimenticia. Se sugiere consultar con su nutricionista.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



IVERDROG-P

Antiparasitario endectocida

 **Antiparasitario** - Polvo



COMPOSICIÓN

Ivermectina 2.5 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

IVERDROG-P está indicado en aves para la prevención y tratamiento de parasitosis internas y externas.

Parasitosis interna: lombrices intestinales.

Ascaridia spp., *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.*, *Syngamus trachea*.

Parasitosis externa: ácaros y piojos.

• *Goniocotes gallinae* (piojo pequeño del plumón del pollito), *Goniodes gigas* (piojo grande del cuerpo del pollo), *Lipectos caponis* (piojo de las plumas de las alas), *Dermanyssus gallinae* (ácaro rojo del gallinero).

Vectores: escarabajo.

• *Aphitobius diaperinus*, escarabajo de la cama o escarabajo negro.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral mezclado con el alimento.

40 mg de IVERDROG-P por kg de peso vivo, durante 7 días consecutivos en aves de cualquier peso y edad. Equivale a 1 kg de IVERDROG-P por tonelada de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Aves: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.



IVERDROG-P12

Antiparasitario endectocida

 **Antiparasitario** - Polvo



COMPOSICIÓN

Ivermectina 12 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

IVERDROG-P12 está indicado en aves para la prevención y tratamiento de parasitosis internas y externas.

Parasitosis interna: lombrices intestinales. *Ascaridia spp.*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.* y *Syngamus trachea*.

Parasitosis externa: ácaros y piojos: *Goniocotes gallinae* (piojo pequeño del plumón del pollito), *Goniodes gigas* (piojo grande del cuerpo del pollo), *Lipectos caponis* (piojo de las plumas de las alas), *Dermanyssus gallinae* (ácaro rojo del gallinero).

Vectores: *Aphitobius diaperinus* (escarabajo de la cama o escarabajo negro).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Pollos de engorde: 250 - 420 g / T de IVERDROG-P12 durante los primeros 21 días de edad, para el control del escarabajo.

Pollas en levante:

167 g / T de IVERDROG-P12 en la 3ª, 4ª y 5ª semana. Descanso en la semana 6.

167 g / T de IVERDROG-P12 en la 7ª, 8ª y 9ª semana. Descanso en la semana 10.

167 g / T de IVERDROG-P12 en la 11ª, 12ª y 13ª semana. Termina el tratamiento.

Ponedoras en producción: 250 g / T de IVERDROG-P12 en 3 ciclos de 21 días con intervalo de 1 semana.

PERIODO DE RETIRO

7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg y 25 kg.

NATURALES

Líquidos

Polvos



EM-DROG

Probiótico – Deodorizante – Larvicida natural

 **Naturales** - Líquido



COMPOSICIÓN

Microorganismos eficaces 50x10⁹UFC, Silicatos fosilizados 20 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

- Probiótico.
- Control de moscas y otros insectos (larvas y adultos) en los residuos orgánicos.
- Control de la humedad y los malos olores de las camas (amoníaco).

DOSIFICACIÓN

Aves y porcinos: 0.5 mL de **EM-DROG** / L de agua de bebida; según programa de acuerdo a la necesidad propia de la granja.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



INMUNOTOX S.O.

Probiótico – deodorizante – larvicida natural

 **Naturales** - Líquido



COMPOSICIÓN

Extracto de *Echinacea purpurea* 50 g, Extracto de sauco (elderberry) 25 g, Extracto de cardo mariano 25 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

INMUNOTOX S.O. está indicado:

- Para la prevención en enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.
- Como un potente hepatoprotector, regenerador y estimulante del sistema inmune.
- En gallinas de postura y reproductoras, aumenta la producción y peso de huevos, mejora la calidad de cáscara y reduce la mortalidad embrionaria.
- En pollos de carne, aumenta la ganancia diaria de peso y su peso final, mejora los niveles de anticuerpos después de las vacunaciones y mejora la calidad de la carne.
- Además, en aves mejora la conversión alimenticia y reduce la mortalidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida constante.

Aves: 1 mL de **INMUNOTOX S.O.** / L de agua constante, durante 7 - 14 días o durante toda la campaña.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



SILYDROG®

Suplemento natural antitoxico

Naturales - Líquido



COMPOSICIÓN

Silimarina 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

SILYDROG® está recomendado en aves, porcinos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos, para prevenir y/o disminuir el daño hepático causado por:

- Toxinas en alimentos.
- Medicamentos.
- Productos químicos.
- Enfermedades bacterianas, fúngicas o virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

1 mL de **SILYDROG®**/10 kg p.v. o 0.1 mL de **SILYDROG®**/kg p.v. o 0.5 L de **SILYDROG®**/1000 L de agua de bebida constante hasta la desaparición de los signos clínicos o por siete días cada mes.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



CITRIDROG L®

Desinfectante orgánico, acidificante y promotor

Naturales - Líquido

COMPOSICIÓN

Ácido cítrico 10%, Ácido ascórbico 11%, Ácido láctico 9%, Ácido acético 9%, Aceite de limón 2%, Aceite de naranja 1%, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

- Recomendado en aves y porcinos, en todas las etapas productivas.
- Prebiótico y promotor de crecimiento
- Acidificante que previene la proliferación de microorganismos nocivos para la flora intestinal favoreciendo la salud e integridad del tracto digestivo del animal.
- Por su actividad antioxidante actúa como protector de las vitaminas liposolubles durante la preparación y almacenaje de los alimentos.
- Desinfectante de superficies, equipos, instalaciones pecuarias y en la industria de productos alimenticios.
- Sanitizante para reducir la carga microbiana de insumos y productos.
- Para disminuir la carga bacteriana de los galpones en presencia de animales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Desinfectante:

De 3 a 5 mL de **CITRIDROG L®** / litro de agua según la carga bacteriana

Desinfección intermedia: 1 a 3 minutos de contacto

Desinfección alta: 5 a 10 minutos de contacto.

Promotor de crecimiento:

De 250 mL a 500 mL de **CITRIDROG L®** por tonelada de alimento según edad, especie (aves y porcinos) y producción.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, y 20 L.



EM-DROG P

Probiótico – deodorizante – larvicida natural



COMPOSICIÓN

Microorganismos eficaces 40×10^8 UFC, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

- Probiótico.
- Mejora la disponibilidad de los nutrientes, el metabolismo de las grasas, la conversión alimenticia, la ganancia de peso previene el hígado graso.
- Mejora la calidad de la cáscara de huevo.
- Control de moscas y otros insectos (larvas y adultos) como *Alphitobius* spp, en los residuos orgánicos.
- Control de la humedad y los malos olores de las camas (amoníaco).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves y porcinos: 0.5 kg de **EM-DROG P** / T de alimento.

PRESENTACIÓN

10 kg, 15 kg y 20 kg.



INMUNODROG® P

Inmunoestimulante natural



COMPOSICIÓN

Extracto de *Echinacea purpurea* 100 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

INMUNODROG® P está indicado como inmunoestimulante en la prevención o tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento, durante 7 - 14 días.

Aves (pollos, gallinas, gallos, pavos y patos):

- 2 kg de **INMUNODROG® P** / T de alimento.
- 1 g de **INMUNODROG® P** / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



SILYDROG® 40

Compuesto natural antitóxico



Naturales - Polvo



COMPOSICIÓN

Silimarina 400 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

SILYDROG® 40 se recomienda para todas las especies, para prevenir y/o disminuir el daño hepático causado por:

- Toxinas en alimentos.
- Medicamentos.
- Productos químicos.
- Enfermedades bacterianas, fúngicas o virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral, en el alimento.

Aves: 0.125 kg de **SILYDROG® 40**/tonelada de alimento, hasta la desaparición de los signos clínicos o por 7 – 10 días cada mes como protector hepático.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



INMUNOTOX

Antitóxico, antioxidante e inmunoestimulante natural



Naturales - Polvo



COMPOSICIÓN

Extracto de Echinacea purpurea 50 g, Extracto de sauco (*elderberry*) 25 g, Extracto de cardo mariano 25 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

INMUNOTOX está indicado:

- Para la prevención en enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.
- Como un potente hepatoprotector, regenerador y estimulante del sistema inmune.
- En gallinas de postura y reproductoras, aumenta la producción y peso de huevos, mejora la calidad de cáscara y reduce la mortalidad embrionaria.
- En pollos de carne, aumenta la ganancia diaria de peso y su peso final, mejora los niveles de anticuerpos después de las vacunaciones y mejora la calidad de la carne.
- En aves mejora la conversión alimenticia y reduce la mortalidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral, en el alimento.

De 1 – 2 kg de **INMUNOTOX** / T de alimento, durante 7 a 14 días.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



CITRIDROG®

Aditivo prebiótico, promotor de crecimiento, desinfectante, sanitizante



 **Naturales** - Polvo

COMPOSICIÓN

Ácidos orgánicos 39%, Extractos cítricos 3%, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

- Acidificante y promotor de crecimiento.
- Desinfectante para espolvorear en camas en presencia de seres vivos.
- Sanitizante para bajar carga microbiana de insumos y productos.
- Aditivo antioxidante para alimentos que previene la rancidez.
- Protector y estabilizante de vitaminas liposolubles durante la preparación y almacenaje de alimento.
- Desinfectante de cama a razón de 20 – 25 g cada 15 días.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves y porcinos: en todas las etapas productivas.

Sanitizante

- **Alimento peletizado:** 1 – 2 kg de CITRIDROG® / T de alimento.
- **Alimento en polvo:** 2 – 3 kg de CITRIDROG® / T de alimento.
- **Ingredientes:** 2 – 4 kg de CITRIDROG® / T de alimento.

Promotor de crecimiento

- **Primera semana:** 500 g de CITRIDROG® / T de alimento.
- **A partir de la segunda semana:** 250 g de CITRIDROG® / T de alimento.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.tt

DESINFECTANTES

Líquidos

GLUTALTEK 1/3®

Asociación biodegradable de rápida acción contra bacterias y hongos

● **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 100 mL, Ácido fosfórico 9 mL, Agua desionizada c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Desinfección de:

- Pediluvios como tapete sanitario.
- Vehículos de transporte de agua, alimento, aves.
- Jaulas de venta de pollos.
- Granjas después de finalizar la campaña (saca de pollos).

MODO DE USO

Diluir 400 mL de GLUTALTEK 1/3® en 200 L de agua.

Aplicar por aspersión o inmersión en caso de pediluvios y dejar actuar por 5 minutos.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

GLUTALTEK 2/3®

Asociación de amplio espectro y rápida acción

● **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 200 mL, Amonio cuaternario 300 mL, Solvente especial c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES

Desinfección de:

- Pediluvios como tapete sanitario.
- Vehículos de transporte de agua, alimento, aves.
- Jaulas de venta de pollos.
- Granjas después de finalizar la campaña (saca de pollos).

MODO DE USO

2 a 4 mL de GLUTALTEK 2/3® / litro de agua. Según el grado de contaminación. Aplicar mediante aspersión o inmersión.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



GLUTALTEK 2

Asociación biodegradable de rápida acción

💧 **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 20%, Ácido Fosfórico 0.9, Ácido fosfórico 9 mL, Solvente Especial c.s.p. 100%.

INDICACIONES

Desinfección de:

- Pediluvios como tapete sanitario.
- Vehículos de transporte de agua, alimento, aves.
- Jaulas de venta de pollos.
- Granjas después de finalizar la campaña (saca de pollos).

MODO DE USO

Desinfección: 2 mL de GLUTALTEK 2 / litro de agua.

Desinfección profunda: 4 mL de GLUTALTEK 2 / litro de agua.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



GLUTALTEK F

Asociación biodegradable de rápida acción

💧 **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 150 mL, Ácido fosfórico 9 mL, Solvente Especial c.s.p. 100 mL, N-Alquil Dimetil Benzil Cloruro de Amonio 100 mL.

INDICACIONES

Desinfección de:

- Jabas para venta de pollos.
- Huevos incubables en granja.
- Granja después de la saca de pollos.
- Material de cama nueva (viruta y/o cascarilla de arroz).
- Galpones, calles, espacios libres.
- Equipos de crianza comederos, bebederos y otros.
- Vehículos de transporte de agua, alimento y animales.

MODO DE USO

Desinfección: 1 litro de GLUTALTEK F / 200 litros de agua.

Huevos incubables, por inmersión con el producto en dilución de 1 litro de GLUTALTEK F / 200 litros de agua, durante 5 minutos.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



VINADROG

Acidificante y removedor de sarro

● **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Ácido acético 5%, Vehículo c.s.p 100%.

INDICACIONES

VINADROG está indicado en explotaciones pecuarias (pollos de carne, aves de postura, pavos, patos y porcinos) como acidificante del agua de bebida, así como para la limpieza y desinfección de los sistemas de agua.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Acidificante de agua de bebida: 2 mL de VINADROG / litro de agua.

Para limpieza de tuberías y sarro: 25 mL de VINADROG / litro de agua.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

VITAMINAS

Líquidos

Polvos

AK STRESS®

Antiestrés y antihemorrágico

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 12 000 000 UI, Vitamina K3 8 g, Metamizol 30 g, Ácido ascórbico 25 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Antiestrés por transporte, calor, aglomeraciones, vacunaciones, enfermedades, cambios en la alimentación, manejo y despique.

Coadyuvante en el tratamiento de síntomas febriles y dolencias de diversas patologías.

Antihemorrágico en cuadros agudos de coccidiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves (pollos de engorde, gallinas en etapa de levante, pavos y patos): 1 mL de AK STRESS®/ L de agua, durante 3 a 5 días

PERIODO DE RETIRO

Aves: 3 días.

No administrar en animales productores de leche para consumo humano.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



AMINOVITADROG

Suplemento nutricional de aminoácidos y vitaminas

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 000 000 UI, Vitamina D3 1 000 000 UI, Vitamina E 3 000 UI, Ácido aspártico 10.4 g, Treonina 4.2 g, Serina 6.3 g, Ácido glutámico 9.3 g, Prolina 4.8 g, Glicina 4.9 g, Alanina 7.2 g, Cistina 1.7 g, Valina 8.4 g, Metionina 0.9 g, Isoleucina 1.6 g, Leucina 11.5 g, Tirosina 2.7 g, Fenilalanina 6.2 g, Triptófano 1.2 g, Lisina 8.2 g, Histidina 6.0 g, Arginina 4.5 g, Vehículo c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

Como activador del crecimiento, en casos de alimentación deficiente, carencias proteicas nutricionales, síndrome de mala absorción, convalecencia, estados de anorexia, desnutrición, estrés. Estimulante del crecimiento, lactancia, gestación, recuperador orgánico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves:

• Promotor: 0.5 mL / L de agua, durante 5 o 7 días.

• Terapéutico: 1 mL / L de agua, durante 5 o 7 días.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.





CHEMI STRESS RC® S.O.

Complejo vitamínico + electrolitos

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 8g, Vitamina B2 16 g, Vitamina B6 11.6 g, Vitamina B12 0.02 g, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 5 g, Vitamina K3 1 g, Niacina 10 g, Ácido fólico 2.8 g, Biotina 0.3 g, Pantotenato de calcio 47 g, Cloruro de sodio 217 g, Cloruro de potasio 34 g, Sulfato de magnesio 7 g, Excipiente soluble c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

CHEMI STRESS RC® S.O. para aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices) y porcinos. Recomendado para prevenir deficiencias vitamínicas. Indicado en casos de trastornos digestivos, trastornos respiratorios, intoxicaciones, reacciones post vacunales, parálisis de los dedos, emplume deficiente, retardo del crecimiento, dermatitis escamosa de las patas, estado de tensión o estrés por enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias y debilidad en general. Aumenta la producción de huevos, mejora la fertilidad e incubabilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: Administrar 100 mL de **CHEMI STRESS RC® S.O.** / 200 litros de agua, por un periodo no menor a 4 días, a consideración del profesional tratante.

En caso de pollos bebé o estadios jóvenes de aves (días de edad), se administrará una toma de 100 mL / 200L agua de bebida a la recepción durante 5 días continuos.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



CHEMI STRESS® S.O.

Complejo vitamínico + electrolitos

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 8g, Vitamina B2 10 g, Vitamina B6 10 g, Vitamina B12 0.15 g, Ácido fólico 1.8 g, Pantotenato de calcio 5 g, Cloruro de sodio 80 g, Cloruro de potasio 34 g, Cloruro de colina 7 g, Sulfato de magnesio 7 g, Excipiente soluble c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

CHEMI STRESS® S.O. está indicado en aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices) como terapia de soporte en cuadros de estrés (exceso de calor, transporte, manejo, vacunación, cambio de alimento). Intoxicaciones alimenticias y medicamentosas, hígado graso, deshidratación, retardo del crecimiento, dermatitis y emplume deficiente. Como coadyuvante en el tratamiento o convalecencia de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. Estimula el apetito, mejora la conversión alimenticia, fertilidad, incubabilidad y aumenta la producción de huevo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

0.5 mL de **CHEMI STRESS® S.O.** Solución oral / litro de agua constante por día, durante un periodo no menor de 4 días hasta la recuperación de los animales y a consideración del médico veterinario responsable.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

COMPLIVIT B S.O.

Suplemento vitamínico

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 5g, Vitamina B2 8 g, Vitamina B12 25 mcg, Niacina 16 g, Biotina 20 mg, Ácido fólico 250 mg, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 8 g, Vitamina K 2 g, Pantotenato de calcio 6 g, Vehículo soluble c.s.p. 1 000 mL.

INDICACIONES

COMPLIVIT B S.O. está indicado en casos de intoxicación, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales, estados de tensión, estrés y debilidad en general. Favorece el crecimiento del animal, mejora el empuje, la fertilidad y la producción de huevos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida para **pollos y gallinas**: 0.5 mL de **COMPLIVIT B S.O.** / litro de agua constante durante 3 a 5 días.

Pavos: 0.25 mL de **COMPLIVIT B S.O.** / litro de agua constante durante 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

DROGAVIT PLUS®

Suplemento multivitamínico

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 20 000 000 UI, Vitamina D3 4 000 000 UI, Vitamina E 10 000 UI, Vitamina B1 5 g, Vitamina B2 5 g, Vitamina B6 3 g, Vitamina B12 10 mg, Vitamina C 50 g, Vitamina K 3 g, Niacina 5 g, Pantotenato de calcio 10 g, Ácido fólico 1 g, Cloruro de sodio 170 g, Sulfato de magnesio 7 g, Cloruro de potasio 34 g, Inositol 2 g, Colina 4.5 g, Agua desionizada c.s.p. 1 000 mL.

INDICACIONES

Ponedoras y reproductoras: Incrementa el porcentaje de puesta y ayuda al mantenimiento de la tasa de producción, incubabilidad y nacimientos a lo largo de todo el ciclo.

Broilers: Previene las deficiencias vitamínicas, estimula el apetito, mejora los parámetros productivos y control de stress. Ideal para situaciones cuando disminuye el consumo de alimento por procesos infecciosos, épocas de calor y síndrome de malabsorción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral, en el agua de bebida por 3 a 5 días

Aves:

Ponedoras y Reproductoras: 1 - 2 mL de **DROGAVIT PLUS®**/ litro de agua de bebida.

Broilers: 0.5 - 1 mL de **DROGAVIT PLUS®**/ litro de agua de bebida.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

Vitaminas

Líquidos



DROVIMIX 5

Suplemento vitamínico

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 65 000 000 UI, Vitamina D3 7 000 000 UI, Vitamina E 50 UI, Vitamina C 100 g, Biotina 10 mg, Vehículo c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

DROVIMIX 5 corrige problemas reproductivos, ayudando en la recuperación de los animales con toxemia por preñez, cetosis, aborto, retención de placenta y crías débiles. En aves acelera la muda y estimula la postura.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida (pollos de engorde y ponedoras):

1er Tratamiento: 100 mL / 1000 pollitos de 3 días de edad por 3 días consecutivos.

2do Tratamiento: 150 mL / 1000 pollitos de 21 días de edad por 3 días consecutivos.

Tratamiento mensual: 150 mL / 1000 pollas, durante el 2do, 3er, 4to y 5to mes de vida por 3 días consecutivos.

Inicio de postura: 250 mL / 1000 pollonas por 3 días consecutivos.

Durante la postura: 250 mL / 1000 gallinas, todos los meses por 3 días consecutivos.

Dosis recomendada: Aves jóvenes: 2-3 mL / L de agua. Aves adultas: 1.5-2 mL / L de agua.

PRESENTACIÓN

100 mL y 1 L.

SAVIMDROG®

Vitaminas, aminoácidos y minerales

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

L-metionina 5 000 mg, Colina 1 500 mg, L-lisina 5 000 mg, Niacina 5 000 mg, Biotina (2%) 50 mg, Vitamina D3 600 000 UI, Vitamina B6 3 000 mg, Vitamina B12 12 mg, Ácido fólico 1 000 mg, Pantotenato de calcio 1 000 mg, Sulfato de manganeso 3 000 mg, Sulfato de magnesio 3 000 mg, Cloruro de potasio 25 000 mg, Cloruro de sodio 15 000 mg, Vehículo c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

SAVIMDROG® como coadyuvante en terapias infecciosas y tóxicas, así mismo, en carencias proteicas, anomalías en la conformación estructural del esqueleto, acortamiento y engrosamiento de patas, alas y articulaciones, perosis, plumaje deficiente, muda forzada, dermatitis en patas y alrededor de los ojos, síndrome de hígado graso, Estados anémicos, síndrome de mala absorción, bajo crecimiento, reducción de la capacidad reproductiva, y gestación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida: 1 mL de SAVIMDROG® / L de agua / 5 - 7 días.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1L, 5 L y 20 L.

VITADROG B®

Suplemento vitamínico + Electrolitos

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 10 g, Vitamina B2 10 g, Vitamina B6 10 g, Vitamina B12 12 mg, Vitamina K3 1 g, Ácido fólico 1 g, Colina 6 mg, Niacina 10 g, Biotina 0,1 mg, Pantotenato de Calcio 4 g, Cloruro de Sodio 85 g, Cloruro de Potasio 34 g, Sulfato de Magnesio 7 g, Agua desionizada c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

VITADROG B® está recomendado en aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices) como terapia de soporte en estados de anemia, debilidad, crecimiento deficiente, dermatitis, trastornos nerviosos, intoxicaciones, hemorragias y cualquier síntoma específico de hipovitaminosis del complejo B. Como coadyuvante en el tratamiento o convalecencia de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. Estimula el apetito, mejora la conversión alimenticia, fertilidad, incubabilidad y aumenta la producción de huevo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida para pollos de engorde, ponedoras, reproductoras, codornices y patos: 0,5 a 1 mL de **VITADROG B®** / litro de agua, durante 5 - 7 días.
Pavos: 1 mL de **VITADROG B®** / litro de agua, durante 5 - 7 días.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1L, 5 L y 20 L.



AK-DROG

Antihemorrágico y regenerador epitelial

 **Vitaminas** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 000 000 UI, Vitamina K3 6 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g.

INDICACIONES

AK-DROG está indicado en aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices), para cubrir los requerimientos por deficiencias de vitaminas A y K, en casos de estrés por transporte, despique, cambios severos en la alimentación y manejo. Indicado para el tratamiento de procesos hemorrágicos en general y como coadyuvantes en el tratamiento de cuadros de coccidiosis, enteritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida: 1 g de / litro de agua de bebida constante durante 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

Vitaminas



CHEMI STRESS RC®

Complejo vitamínico + electrolitos



Vitaminas - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 8 g, Vitamina B2 16 g, Vitamina B6 11.6 g, Vitamina B12 0.02 g, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 5 g, Vitamina K3 1 g, Niacina 10 g, Ácido fólico 2.8 g, Biotina 0.3 g, Pantonato de calcio 47 g, Cloruro de sodio 217 g, Cloruro de potasio 34 g, Sulfato de magnesio 7 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

CHEMI STRESS RC® está indicado en aves: pollos, gallinas, pavos, patos y codornices. Recomendado para prevenir deficiencias vitamínicas. Indicado en casos de trastornos digestivos, trastornos respiratorios, intoxicaciones, reacciones post vacunales, emplume deficiente, retardo del crecimiento, dermatitis escamosa de las patas, estado de tensión o estrés por enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias y debilidad en general. Aumenta la producción de huevos, mejora la incubabilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves: Administrar 100 g de **CHEMI STRESS RC®** / 200 litros de agua, por un período no menor a 4 días, a consideración de l profesional tratante.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



CHEMI STRESS®

Complejo vitamínico + electrolitos



Vitaminas - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 8 g, Vitamina B2 10 g, Vitamina B6 10 g, Vitamina B12 0.015 g, Ácido fólico 1.8 g, Pantonato de calcio 5 g, Cloruro de sodio 80 g, Cloruro de potasio 34 g, Sulfato de magnesio 7 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

CHEMI STRESS® está recomendado en aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices) como terapia de soporte en cuadros de estrés (exceso de calor, transporte, manejo, vacunación, cambio de alimento), Intoxicaciones alimenticias y medicamentosas, hígado graso, deshidratación, retardo del crecimiento, dermatitis y emplume deficiente. Como coadyuvante en el tratamiento o convalecencias de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. Estimula el apetito, mejora la conversión alimenticia, fertilidad, incubabilidad y aumenta la producción de huevo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida: 100 g de **CHEMI STRESS®** / 200 litros de agua por un período no menor de 4 días y a consideración del médico veterinario responsable.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



CLOR VIT H

Polivitamínico y antihistamínico



Vitaminas - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 50 000 UI, Vitamina D3 6 000 UI, Vitamina E 20 UI, Vitamina B1 4 g, Vitamina B2 5 g, Vitamina B6 4 g, Vitamina B12 0.02 g, Ácido fólico 0.60 g, Cloropropilpiridamina 1 g, Pantonato de calcio 5 g, Excipiente c.s.p. 1000 g, Avitaminosis

INDICACIONES

- Estimulación del crecimiento.
- Estimulación de la postura.
- Mejora la asimilación del alimento.
- Hepatoprotector.
- Problema de ronquera, brotes de hepatitis.
- Estados de estrés.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida: 100 g de **CLOR VIT H** / 200 L de agua o 50 mg de **CLOR VIT H** / kg p.v., de manera constante por 3 días o a criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO

5 días.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



COMPLIVIT B

Suplemento vitamínico



Vitaminas - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 5 g, Vitamina B2 6 g, Vitamina B12 25 mcg, Niacina 16 g, Biotina 20 mg, Ácido fólico 250 mg, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 8 g, Vitamina K 2 g, Pantonato de calcio 6 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

COMPLIVIT B está indicado en casos de intoxicación, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales, estados de tensión, estrés y debilidad en general. Favorece el crecimiento del animal, mejora el emplume, la fertilidad y producción de huevos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida (pollos y gallinas): 100 gramos de **COMPLIVIT B** / 200 litros de agua de bebida durante 3 a 5 días.

Pavos: 50 gramos de **COMPLIVIT B** / 200 litros de agua de bebida durante 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



DROGAVIT E®

Multivitamínico + electrolitos

 **Vitaminas** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 5 000 000 UI, Vitamina D3 500 000 UI, Vitamina E 300 UI, Vitamina B1 2 g, Vitamina B2 5 g, Vitamina B6 3 g, Vitamina B12 0.025 g, D-Pantotenato de calcio 5 g, Vitamina C 20 g, Vitamina K 12 g, Ácido fólico 0.2 g, Niacina 5 g, Sulfato magnesio 7 g, Cloruro de sodio 170 g, Cloruro de potasio 34 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

DROGAVIT E® contrarresta el estrés durante enfermedades, procesos vacunales, traslados, cambios de clima. Refuerza la función hepática y restituye la pérdida de líquidos corporales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves: Disolver 100 g de **DROGAVIT E®** en 200 litros de agua.

Se recomienda preparar la solución diariamente, mantenerla bajo sombra y protegida de temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



ELECTRESS D®

Complejo vitamínico

 **Vitaminas** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 000 000 UI, Vitamina D3 2 000 000 UI, Vitamina E 3000 UI, Vitamina B6 2 g, Vitamina B12 10 mg, Vitamina C 20 g, Vitamina K 5 g, Ácido fólico 250 mg, Pantotenato de calcio 5 g, Sulfato magnesio 7.7 g, Cloruro de potasio 3.7 g, Cloruro de sodio 23.8 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

ELECTRESS D® está indicado en aves, porcinos, bovinos, equinos y caninos; para contrarrestar los estados de estrés ocasionados por procesos vacunales, despiques, traslado, cambios de clima y ventilación deficiente. Facilita la recuperación de los animales luego de procesos febriles y de deshidratación. Actúa como coadyuvante en el tratamiento de infecciones respiratorias, coccidiosis, enteritis, parasitosis y micotoxiosis. Estimula la postura, el crecimiento y mejora la asimilación alimenticia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices): 0.5 a 1 g de **ELECTRESS D®** / litro de agua.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

DROGAVIT



HEPA VIT

Antitóxico, lipotrópico y protector hepático

 **Vitaminas** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 g, Vitamina B2 18 g, Vitamina B6 12 g, Vitamina B12 0,015 g, Ácido fólico 2,8 g, Ácido orótico 2,5 g, Pantotenato de calcio 47 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

Está recomendado en aves como protector hepático, desintoxicante y lipotrópico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves, porcinos, bovinos, equinos, caninos y felinos: 100 g de HEPA VIT / 200 L de agua o 50 mg de HEPA VIT / kg p.v., durante 2 – 3 días.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



VITA VET PLUS

Suplemento vitamínico

 **Vitaminas** - Polvo



COMPOSICIÓN

Retinol (Vitamina A) 5 000 000 U, Colecalciferol (Vitamina D3) 1 000 000 UI, Tiamina (Vitamina B1) 1 g, Riboflavina (Vitamina B2) 3,0 g, Niacina (Vitamina B3) 2 g, Pantotenato de Calcio (Vitamina B5) 8 g, Piridoxina (Vitamina B6) 1 g, Biotina (Vitamina B7) 0,05 g, Ácido fólico (Vitamina B9) 1,25 g, Cianocobalamina (Vitamina B12), 20 mg, Menadiona (Vitamina K3) 1 g, Tocoferol (Vitamina E) 5 000 UI, Metionina 50 g, Sulfato de magnesio 7 g, Cloruro de sodio 75 g, Cloruro de potasio 25 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

Indicado para la prevención y tratamiento de avitaminosis, alteraciones del metabolismo mineral y baja disponibilidad de vitaminas en animales jóvenes. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias, afecciones hepáticas, intoxicaciones, micotoxinas, estados de estrés (vacunaciones, transporte, temperaturas excesivas, manejo, cambio de alimento, despique) y distrofias óseas como raquitismo, osteomalacia y cojera. Estimula el crecimiento, ganancia de peso, fertilidad y mejora la postura e incubabilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Aves y porcinos: 100 g de VITA VET PLUS /200 litros de agua o 1 g de VITA VET PLUS / 2 litros de agua, durante 3 – 5 días continuos.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

SUPLEMENTOS

Inyectables



BANEMIN B12

Reconstituyente orgánico

 **Suplemento** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Vitamina B12 1 mg, Histidina HCl 0.50 g, Triptófano 0.25 g, Vehículo c.s.p. 1mL

INDICACIONES

En deficiencias, trastornos hematopoyéticos por parasitismo, protozoarios hemáticos, trastornos neuromusculares por agotamiento físico o sexual, anemias, reconstituyente en convalecencia de enfermedades infecciosas, enflaquecimiento, debilidad, inapetencia, estimulante del apetito, crecimiento, producción, intoxicaciones, calda de pelo, preparación de animales y exposición.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Aves de corral: 0.1 – 1 mL / animal por 3 a 5 días.

*Dosis a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



DROGVIT B®

Suplemento vitamínico

 **Suplemento** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) 10 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 2 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida) 50 mg, Vitamina B5 (Pantotenato de calcio) 5 mg, Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 10 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 50 mg, Vehículo c.s.p. 1mL

INDICACIONES

En deficiencias de vitamina B, trastornos (neuromusculares, metabólicos y hematopoyéticos), anemias, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, enflaquecimiento, debilidad, inapetencia y agotamiento sexual. Estimulante del apetito, crecimiento y producción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Aves de corral: 0.1 a 1 mL / animal / 3 a 5 días.

*Dosis a criterio del médico veterinario.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

DROGAVEL



VIGORDROG®

Reconstituyente y estimulante
del crecimiento

 **Suplemento** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Triptófano 2.5 mg , Histidina 5 mg, Metionina 10 mg, Lisina 10 mg, Acido cítrico 5 mg, Tiamina clorhidrato 5 mg, Ribo flavina 2 mg, Nicotinamida 50 mg, Vitamina B12 15 mcg, Piridoxina clorhidrato 10 mg, Hierro (Citrato amoniacal) 20 mg, Cobalto 0.5 mg, Cacodilato de sodio 30 mg, Glicerofosfato de sodio 20 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Trastornos de la hematopoyesis, anemia, trastornos del metabolismo, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, enflaquecimiento, debilidad, inapetencia, fracturas, intoxicaciones y agotamiento sexual. Estimulante del apetito, del crecimiento y la producción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía IM profunda, SC o EV lenta.

Porcinos: 1 - 2 mL/ave..

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ANABÓLICO

Inyectable



BOLDEDROG®

Anabólico de acción prolongada

 Anabólico - Inyectable



COMPOSICIÓN

Undecilenato de boldenona 50 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Incremento de masa muscular en animales de engorde. Coadyuvante en tratamiento de enfermedades tipo consuntivo, anemia, raquitismo, parasitosis y fracturas. Estrés por destete, procesos postquirúrgicos y castración.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Porcinos: 1 mL de BOLDEDROG® / 90 kg p.v.

En animales de engorde para mejores resultados, repetir la dosis a las 4 semanas.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 71 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



Conoce todos nuestros productos entrando a:

www.laboratoriosdrogavet.com



Av. Los Cóndores Mz. K, El Club 1era. Etapa, Santa María de Huachipa, Lurigancho. Lima - Perú.
Central: (511) 371-0390, Anexo 105 | Email: ventas@grupodrogavet.com / Cel. 981010251
Web: www.grupodrogavet.com.pe



Grupo Drogavet



Grupo Drogavet



Grupo Drogavet Perú



Grupo Drogavet Perú