



LÍNEA

PORCINA



COMPROMETIDOS CON **NUTRIR** UN MUNDO SIN FRONTERAS



Perú



Guatemala



Bolivia



Vietnam



El Salvador



Panamá



Nicaragua



Ecuador



Costa Rica



Colombia



República
Dominicana



Honduras



Paraguay



Uruguay



Argentina



México



Innovación | Confiabilidad | Eficacia

“Más de 18 años Liderando la Industria Pecuaria”



MISIÓN

Nos preocupamos por cuidar de la sanidad agro-veterinaria integrada a la salud de las personas. Nuestros productos fabricados con una metodología propia y única, altamente intensiva en investigación y desarrollo, garantizan agregar valor a nuestros clientes en términos de salud y productividad.

Aseguramos la entrega oportuna de soluciones especializadas basándonos en la excelencia de cada uno de nuestros procesos que incluye asesoría técnica personalizada brindada por personal altamente calificado.



VISIÓN

Al 2023 ser líderes en ventas a nivel nacional, reconocidos como una de las 10 marcas más importantes a nivel global en satisfacción de clientes, ofreciendo soluciones efectivas, seguras e innovadoras.

Índice

Antibióticos

11

Líquidos

Broncox D® Solución Oral	12
Ciprodrog 20%®	12
Diaerom-N	13
Doxidrog 20®	13
Enroflyn 10%®	14
Enroflyn 20%®	14
Florfenidrog®- L	15
Fosfodrog T®	15
Fosfodrog®- L	16
Fosfodrog® C	16
Gatifloxadrog®	17
Lincodrog-N	17
Norflyn 20%	18
Sanadrog® S.O.	18
Sulfadrog®	19
Sulfamix® S.O.	19
Tilmicodrog®	20

Polvos

Broncox D®	20
Bmdrog P	21
Dromoxil	21
Doxidrog-50®	22
Doxidrog C-Plus®	22
Florfenidrog L-2®	23
Florfenidrog®-F5	23
Heat 4L®	24
Lincodrog-S®	24

Lincodrog-P®	25
Neomidrog 50®	25
Norflamox®RP	26
Norflamox®	26
Oxidrog-T	27
Oxidrog L	27
Sulfatrim T	28
Sulfamix®	28
Sulfaquin-T	29
Tiamudrog®	29
Tilodrog-P	30
Tilodrog	30
Tilmicodrog®P	31
Sulfadit D®	31

Inyectables

Amoxides G L.A.®	32
Amoxides L.A.®	32
Broncox D Solución Inyectable®	33
Ciprodrog INY®	33
Doxidrog INY®	34
Enrodrog®	34
Enrodrog®20	35
Fosfodrog T INY®	35
Florfenidrog®	36
Oxidrog INY	36
Oxiketadrog L.A.®	37
Oxidrog L.A.®	37
AZ-drog L.A.	38
Ceftidrog®	38
Sulfamix INY®	39

Vitaminas 40

Líquidos

Aminovitadrog	41
AK Stress®	41
Complivit B S.O.	42

Drovimix 5	42
Savimdrog®	43
Polvos	
Chemi Stress RC®	43
Complivit B	44
Drogavit E®	44
Electress D®	45
Hepa Vit	45
Vita Vet Plus	46
Desinfectantes	47
Líquidos	
Citridrog L®	48
Droyovet®	48
Glutaltek 2/3®	49
Kreso Alemán	49
Vinadrog	50
D.A-Cidrog	50
Polvos	
Citridrog®	51
Naturales	52
Líquidos	
EM-drog	53
Inmuno E Pig S.O.	53
Silydrog®	54
Sindrog S.O. *REGISTRO EN TRÁMITE	54
Polvos	
EM-drog P	55
Silydrog®40	55
Inmuno E Pig	56
Sindrog *REGISTRO EN TRÁMITE	56
Expectorantes	57
Líquidos	
Espectodrog®N	58
Espectodrog®Plus	58

Espectodrog®	59
Antidiarreico	60
Líquido	
Diaerom-Plus	61
Analgésico y Antipirético	60
Líquido	
Aspidrog®S.O.	61
Control de Moscas	60
Polvo	
Larvadrog®	62
Salud Intestinal	60
Polvo	
Randrog Pig	62
Antiparasitario	60
Polvo	
Iverdrog-P12	63
Inyectables	
Iver drog	63
Iverdrog 1.5®	64
Anabólico	65
Inyectable	
Boldedrog®	66
Suplementos	67
Inyectables	
ADE Drog®	68
Drogvit B®	68
Hierrodrog-12 20%®	69
Vigordrog®	69

Antiinflamatorios

70

Inyectables

Dexadrog®

71

Flunidrog®

71

Ketodrog®

72

Proximamente

73

Inyectable

Randrog INY *PRODUCTO EN DESARROLLO

74

Polvo

Omedrog Pig *PRODUCTO EN DESARROLLO

74

ANTIBIÓTICOS

Líquidos

Polvos

Injectables

BRONCOX D®

SOLUCIÓN ORAL

Combinación de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

BRONCOX D® Solución Oral está indicado para el tratamiento y control de Neumonía enzoótica, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; erisipelas causadas por *Erysipelothrix rhusiopathiae*; rinitis atrófica y disentería porcina. Artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua o el agua de bebida.

Tratamiento: 0.1 mL de BRONCOX D® Solución Oral / kg de p.v. / día o 1 L de BRONCOX D® Solución Oral / 1000 L de agua, durante 3 a 5 días.

Control de micoplasma: Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante de 5 a 7 días por mes, a criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 8 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

CIPRODROG 20%®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Ciprofloxacina 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

CIPRODROG 20%® está indicado en cerdos para el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano. Su espectro de acción comprende microorganismos como *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyosynoviae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* sp., *Pasteurella* sp., *Salmonella* sp., *Staphylococcus* sp., *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 mL CIPRODROG 20%® / 32 kg p.v. durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

DIAEROM-N

Antibiótico y antidiarreico

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfato de neomicina 150 g, Caolín 150 g, Pectina 4.4 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL
*150 g de sulfato de neomicina contienen 90 g de neomicina

INDICACIONES

Tratamiento de procesos diarreicos agudos por cepas susceptibles de *E. coli*, *Salmonella* spp., *Brachyspira hyodysenteriae*, *Klebsiella* spp., *Proteus* spp. en porcinos. Coadyuvante en el tratamiento de diarreas inespecíficas e intoxicaciones alimentarias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral: agua de bebida.

Porcinos: Administrar sin diluir 0.1 mL de DIAEROM-N /kg. p.v. /24 h. Puede continuar 24 – 48 h después de remisión de signos clínicos (máximo 14 días consecutivos).

PERIODO DE RETIRO

Carne: 3 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

DOXIDROG 20®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Doxiciclina HCl 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram positivas y negativas (*Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Pasteurella* spp., *Campylobacter* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Sphaerophorus necrophorus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Actinobacillus* spp., *Actinomyces bovis*, *Leptospira pomona*, *Moraxella bovis*, *Erysipelothrix insidiosa*, *Corynebacterium* spp., *Listeria* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.) y microorganismos de las familias *Chlamydiae*, *Mycoplasmataceae* y *Rickettsiaceae* (*Anaplasma* spp.).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Porcinos:

1 mL / 20 kg p.v. / día, durante 5 días o 0.05 mL / kg p.v. / día, por 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL y 1 L.



ENROFLYN 10%®

Antibiótico de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infecciones en porcinos causadas por gérmenes como *Mycoplasma* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Bordetella* spp., *Campylobacter* spp., *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp., *Erysipelothrix* spp., *Fusobacterium* spp., *Klebsiella* spp., *Listeria* spp., *Moraxella* spp., *Serratia* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp. y *Vibrio* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral, en el agua de bebida.

Porcinos: 0.5 mL de ENROFLYN 10%* / 10 kg p.v (eq. a 5 mg / kg p.v.); durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 10 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ENROFLYN 20%®

Antibiótico de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 200 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infecciones en porcinos causadas por gérmenes como *Mycoplasma* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *E. coli*, *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Bordetella* spp., *Campylobacter* spp., *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp., *Erysipelothrix* spp., *Fusobacterium* spp., *Klebsiella* spp., *Listeria* spp., *Moraxella* spp., *Serratia* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp. y *Vibrio* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral, en el agua de bebida.

Porcinos: 0.5 mL de ENROFLYN 20% / 20 kg p.v. (equivalente a 5 mg / kg p.v.); durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 10 días.

*Depende de la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

FLORFENIDROG®- L

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Florfenicol 100 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Está indicado para infecciones causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos, como *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Clostridium* spp. y micoplasma.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida

Porcinos: 1 mL / L de agua/ día, durante 5 días consecutivos (eq. a 100 ppm de florfenicol).

Considerar el consumo promedio de agua en cerdos es aproximadamente 2 - 3 veces el del alimento.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 16 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

FOSFODROG T®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g, Trimetoprim 25 g, Excipiente c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida

Porcinos.

Vía oral en el agua de bebida.

1 mL FOSFODROG T® Solución Oral / litro de agua de bebida constante o

1 mL FOSFODROG T® Solución Oral / 10 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



FOSFODROG®- L

Antibiótico

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis y metritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 mL de FOSFODROG® L / litro de agua el primer día, posteriormente 0.5 mL de FOSFODROG® L / litro de agua constante por 3 a 5 días o 1 mL de FOSFODROG® L / 10 kg p.v. por día durante 3 a 5 días consecutivos.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



FOSFODROG® C

Asociación antibiótica

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 g, Ciprofloxacina 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis y metritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

1 mL de FOSFODROG® C / L de agua constante o 1 mL de FOSFODROG® C / 10 kg p.v. el primer día, luego administrar 0.5 mL de FOSFODROG® C / L de agua de bebida.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

GATIFLOXADROG®

Fluoroquinolona de cuarta generación

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Gatifloxacina 80 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

GATIFLOXADROG® está indicado para el tratamiento de micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, septicemias, pasteurelosis, colibacilosis, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis e infecciones urogenitales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 mL de GATIFLOXADROG® / L de agua de bebida constante o 1 mL de GATIFLOXADROG® / 10 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 8 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

LINCODROG-N

Asociación antibiótica de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 110 g, Neomicina sulfato 125 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

LINCODROG - N para el tratamiento y control de enfermedades causadas por bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobios y micoplasmas en porcinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos:

De 1 – 2 mL de LINCODROG - N / L de agua de bebida constante / 3 – 5 días.

De 1 – 2 L de LINCODROG - N / 1000 L de agua constante / 3 – 5 días.

A criterio del Médico Veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

Antibióticos

Líquidos

NORFLYN 20%

Antibiótico de amplio espectro

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento y control de infecciones causadas por *Mycoplasma* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

Porcinos: Infecciones del tracto urinario inferior (cistitis, uretritis, prostatitis aguda y crónica) y superior (pielonefritis), infecciones del aparato genital y uretritis gonocócica no complicada.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 0.3 mL de NORFLYN 20% / litro de agua de bebida constante o 1 mL de NORFLYN 20% / 32 kg p.v. / día (Equivalente a 6 mg de norfloxacin / kg p.v.), durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

SANADROG® S.O.

Combinación antibiótica

🔥 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Lincomicina clorhidrato 100 g, Doxiciclina clorhidrato 150 g, Vehículos c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Tratamiento de rinitis atrófica causada por *Pasteurella multocida* y *Bordetella bronchiseptica*, así como en bronconeumonías originadas por *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* y *Mycoplasma hyorhinis*. En casos de pleuropneumonía por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y enteritis proliferativa porcina (*Lawsonia intracellularis*).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral en el agua de bebida.

Tratamiento: 1 L de SANADROG® S.O. / 1000 L de agua, durante 5 días; o 0.1 mL de SANADROG® S.O. / kg p.v. por día, durante 5 días.

Control de Micoplasma: Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante 1 semana por mes, a criterio del Médico Veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 8 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

SULFADROG®



Antibacteriano de amplio espectro

🔴 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfametoxazol 200 g, Trimetoprim 40 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Neumonías, septicemias, pasteurelosis, coccidiosis y diarreas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 0.5 mL de Sulfadrog® / L de agua constante, durante 3 a 5 días.

En casos severos: 1 mL Sulfadrog® / L de agua, o 1 mL Sulfadrog® / 10 a 20 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días, según criterio del Médico Veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

SULFAMIX® S.O.



Antibacteriano de amplio espectro

🔴 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 150 g, Sulfadiazina sódica 150 g, Trimetoprim 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis (diarreas), pasteurelosis (neumonía bacteriana), coccidiosis y septicemias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

1 mL de Sulfamix® S.O. / 10 kg p.v. / día o

100 mg de Sulfamix® S.O. / kg p.v. / día o

1 mL Sulfamix® S.O. / litro de agua de bebida constante, por 3 – 5 días.

Casos severos: Se puede duplicar la dosis por 1 a 2 días y continuar con la recomendada hasta completar el tratamiento por 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario responsable.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

TILMICODROG®

Antibiótico eficaz en enfermedades respiratorias

 **Antibiótico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Tilmicosina fosfato 250 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Porcinos: Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias en Porcinos asociadas a *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

Porcinos: 6 a 8 mL /100 kg p.v. (equivalente a 15 a 20 mg/kg p.v. de tilmicosina) o 0.8 mL / litro de agua de bebida constante por 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

BRONCOX D®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Doxiciclina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Actúa frente a neumonía *enzoótica*, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; *Erysipelothrix rhusiopathiae*, rinitis atrofica, disentería porcina y artritis por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos vía oral.

Agua de bebida: 100 mg de BRONCOX D® / kg p.v./día, por 3 a 5 días o 1 kg de BRONCOX D® /1000 L por 3 a 5 días (preparación diaria).

Alimento: 2 kg de BRONCOX D® / T por 5 a 7 días

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

BMDROG P

Antibacteriano

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Bacitracina metileno disalicilato 110 g, Excipiente c.s.p. 1000 g (1 g de BMD equivale a 42 000 U de bacitracina).

INDICACIONES

Porcinos como:

- Promotor de crecimiento: mejora de ganancia de peso, optimiza la conversión alimenticia y mejora el crecimiento.
- Prevención y control de enteritis causada por *Clostridium perfringens*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Promotor de crecimiento: 270 g de BMDROG P / T, en forma continua.

Tratamiento y control de enteritis necrótica: 2.270 kg de BMDROG P / T, por dos semanas antes del parto y tres semanas después.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 0 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

DROMOXIL

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidratada 600 g, Vehículo c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

DROMOXIL está indicado para el tratamiento de la salmonelosis, colibacilosis, enfermedad respiratoria crónica, artritis bacteriana, pasteurellosis y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Porcinos: 200 a 400 ppm de DROMOXIL en el alimento durante la etapa de post destete (4 semanas).

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.



DOXIDROG-50®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Doxiciclina HCl 500 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía bacteriana, leptospirosis, anaplasmosis, piroplasmosis, enteritis, ántrax, prostatitis, brucelosis, pasteurelosis, carbunco sintomático, infecciones del aparato genital, ehrlichiosis, erisipela, diarreas bacterianas, mastitis y metritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral según corresponda.

Porcinos: Agua de bebida: 0.2 g / L de agua, o 1 g / 50 kg p.v., durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 8 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg y 20 kg.



DOXIDROG C-PLUS®

Asociación antibiótica de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Doxiciclina 200 g, Ciprofloxacina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

DOXIDROG C-PLUS® está indicado en el tratamiento de enfermedad respiratoria crónica, micoplasma, colibacilosis, colisepticemia, pasteurelosis, pseudomoniasis, salmonelosis, infecciones por estafilococos y *Erysipelothrix* sp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 50 – 100 mg de DOXIDROG C-PLUS® / kg p.v. / día durante 3 a 5 días.

1 kg de DOXIDROG C-PLUS® / 1000 litros de agua constante durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 8 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

FLORFENIDROG L-2®

Antibiótica



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Florfenicol 20 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

FLORFENIDROG L-2® está indicado para promover la ganancia de peso y la conversión alimenticia en porcinos; ya que previene y controla las posibles infecciones causadas por microorganismos gram positivos y negativos, como *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Streptococcus* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Clostridium* spp., *Actinobacillus* spp. y *Mycoplasma* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Promotor de crecimiento: 1a 2 kg de FLORFENIDROG L-2® / T de alimento, en forma constante o a criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 24 horas.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

FLORFENIDROG®-F5

Combinación antibiótica



Antibiótico - Polvo



COMPOSICIÓN

Florfenicol 50 g, Fosfomicina 50 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

FLORFENIDROG®-F5 está indicado en porcinos contra gérmenes sensibles a la fosfomicina y al florfenicol como la *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Clostridium* spp., *Mycoplasma* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

En el alimento como:

Promotor de crecimiento: 0.5 a 1 kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento en forma constante.

Control: 1 a 2 kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 28 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



HEAT 4L®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfamonometoxina sodica 800 g, Trimetoprim 200 g

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis, toxoplasmosis y rinitis atrófica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento.

Porcinos:

Agua, leche o en la ración diaria: 15 mg – 20 mg HEAT 4L® / kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días.

Alimento: 400 – 500 g HEAT 4L® / tonelada de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



LINCODROG-S®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 44 g (eq. a 40 g de base), Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: *Brachyspira hyodysenteriae*, *Clostridium* spp.; también actúa contra especies susceptibles de micoplasma.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento.

Porcinos:

• Tratamiento de neumonía causada por *Mycoplasma* spp.: 5 kg de LINCODROG-S® / tonelada de alimento durante 3 semanas seguidas (eq. a 200 ppm de lincomicina base).

• Disentería porcina causada por agentes sensibles como *Brachyspira hyodysenteriae*:

Tratamiento: 2.5 kg de LINCODROG-S® / tonelada de alimento durante 3 semanas seguidas (eq. a 100 ppm de lincomicina base).

Control: 1 kg de LINCODROG-S® / tonelada de alimento de forma continua (eq. a 40 ppm de lincomicina base).

PERIODO DE RETIRO

Porcinos que reciben dosis de 1 kg de LINCODROG-S® / tonelada de alimento: 0 días.

Porcinos que reciben dosis de 2.5 kg - 5 kg de LINCODROG-S® / tonelada de alimento: 6 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

LINCODROG-P®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Lincomicina HCl 110 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Promotor: Para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimentaria.

En porcinos para el control y tratamiento de disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos:

Disentería porcina: Tratamiento: 1 kg / T de alimento por 21 días o hasta desaparición de signos clínicos. Control: 400 g / T de alimento de forma continua.

Neumonías por *Mycoplasma spp.*: 2 kg / T de alimento por 21 días o hasta desaparición de signos clínicos.

Enteropatías proliferativas: 1 kg/T de alimento por 21 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

NEOMIDROG 50®

Antibiótico de rápida acción

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfato de neomicina 500 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de enteritis bacterianas sensibles a la neomicina, principalmente causadas por *Escherichia coli*.

Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, disentería vibrionica y enfermedad del edema.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en alimento o agua de bebida.

Tratamiento: 300 – 500 g de NEOMIDROG 50® / T de alimento / 0.3 a 0.5 g de NEOMIDROG 50® / litro de agua de bebida (eq. / 30 - 50 mg de NEOMIDROG 50® / kg p.v.), durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



NORFLAMOX® RP

Asociación antibiótica

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 120 g, Amoxicilina 150 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrófica, diarreas infecciosas y otros procesos respiratorios y digestivos de diferentes etiologías.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral, en el alimento.

Porcinos:

- **Promotor de crecimiento y producción:** 300 g de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento en forma continua.
- **Tratamiento:** 1 kg de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



NORFLAMOX®

Asociación antibiótica

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Norfloxacin 200 g, Amoxicilina 100 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrófica, diarreas infecciosas y otros procesos respiratorios y digestivos de diferentes etiologías.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 100 mg de NORFLAMOX® / kg p.v. o 1 g de NORFLAMOX® / L de agua de bebida constante.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

OXIDROG-T

Combinación antibiótica de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 50 g, Oxitetraciclina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Es eficaz contra bacterias gram positivas, gram negativas y micoplasmas: *E.coli* (Colibacilosis y colisepticemia), *Lawsonia intracellularis* (Enteropatía proliferativa porcina), *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, síndromes respiratorios y clostridiosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos:

Tratamiento:

Agua de bebida: 200 mg de OXIDROG-T / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días consecutivos o 2 kg de OXIDROG-T / 1000 litros de agua continua, durante 3 o 5 días (preparación diaria) o a criterio del Médico Veterinario responsable.

Control en el alimento: 2 kg de OXIDROG-T / tonelada de alimento durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

OXIDROG L

Asociación de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina base 200 g, Lincomicina HCl 44 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: Neumonías bacterianas, leptospirosis, enteritis, ántrax, prostatitis, brucelosis, pasteurellosis, infecciones del aparato genital, ehrlichiosis, erisipela, diarreas bacterianas y síndrome metritis mastitis agalactia (SMMA).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Porcinos: 0.5 kg de OXIDROG L / T de alimento en forma continua.

Tratamiento: 1 kg de OXIDROG L / T de alimento, durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



SULFATRIM T

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 400 g, Sulfametoxazol 400 g, Trimetoprim 200 g

INDICACIONES

Porcinos: Coccidiosis, septicemia hemorrágica, pasteurelosis y neumonías bacterianas secundarias asociadas a influenza.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral según corresponda:

Tratamiento: 400 - 500 g de SULFATRIM T / T de alimento o 30 - 40 mg de SULFATRIM T / kg p.v., durante 3 - 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



SULFAMIX®

Antibacteriano de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 30 g, Sulfadiazina sódica 30 g, Trimetoprim 15 g, Bromhexina HCl 10 g, Excipiente c.s.p. 100 g

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis (diarreas), pasteurelosis (neumonía bacteriana) y septicemias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el alimento o agua de bebida.

Porcinos: 30 mg de SULFAMIX® / kg p.v. / día, durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.

SULFAQUIN-T

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfaquinoxalina 800 g, Trimetoprim 200 g

INDICACIONES

Para la prevención y tratamiento de coccidiosis, casos de colibacilosis, salmonelosis y pasteurelosis.

Actúa frente a *Elmeria* spp., *Isospora* suis, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. y *Pasteurella multocida*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Porcinos: 50 a 70 g de SULFAQUIN-T / 200 litros de agua o 500 a 700 g de SULFAQUIN-T / tonelada de alimento, durante 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

TIAMUDROG®

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Fumarato hidrogenado de tiamulina 200 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía enzoótica, pleuroneumonía, poliserositis y disentería porcina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral según corresponda.

Porcinos en el alimento:

- Promotor: 150 a 200 g TIAMUDROG® / T en forma continua.
- Terapéutico: 500 g de TIAMUDROG® / T durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.



TILODROG-P

Antibiótico

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Fosfato de tilosina 100 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Para la prevención y control de la ERC, disentería porcina y abscesos hepáticos. Recomendado también como promotor de crecimiento y mejora la conversión alimenticia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado en el alimento.

Porcinos:

Prevención: 0.55 kg de TILODROG-P / T, durante 5 – 7 días.

Tratamiento: 1.1 kg de TILODROG-P / T, durante 7 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.



TILODROG

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 100%

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía enzoótica, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; erisipelas causadas por *Erysipelothrix rhusiopathiae*; rinitis atrófica, disentería porcina y artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Porcinos:

Agua de bebida: 0.25 g de TILODROG / litro de agua / día durante 3 a 5 días.

Alimento: 0.55 – 0.6 kg de TILODROG / tonelada durante 5 a 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

TILMICODROG® P

Antibiótico bacteriostático

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Tilmicosina fosfato 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Porcinos: Tratamiento y control de infecciones asociadas a *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*; y otros microorganismos patógenos sensibles a la tilmicosina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía oral, en el alimento.

1 - 2 kg de TILMICODROG® P / T de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

SULFADIT D®

Antibacteriano coccidicida

 **Antibiótico** - Polvo



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 800 g, Trimetoprim 200 g

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis, toxoplasmosis y rinitis atrófica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral según corresponda:

En el agua: 50 g de **SULFADIT D®** / 200 L de agua durante 3 - 5 días o 30 mg de **SULFADIT D®** / kg p.v. / día, durante 3 - 5 días.

En el alimento: 300 - 400 g de **SULFADIT D®** / T, durante 5 - 7 días o 30 mg de **SULFADIT D®** / kg p.v./ día, durante 3 - 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 15 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.

AMOXIDES G L.A.®

Antibiótico + antiinflamatorio

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidratada 15 g, Sulfato de gentamicina 4 g, Dexametasona fosfato 0.15 g, excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES

Porcinos: Diarreas causadas por *Escherichia coli*, salmonelosis, síndrome MMA, artritis, enfermedades respiratorias y sistémicas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: Exclusivamente vía intramuscular profunda: 1 mL de AMOXIDES G L.A.* / 10 kg p.v. Si fuera necesario repetir a las 48 horas.

En dosificaciones altas es recomendable utilizar dos puntos de aplicación repartiendo la dosis para favorecer su absorción

PERIODO DE RETIRO

Carne: 25 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

AMOXIDES L.A.®

Antibiótico + antiinflamatorio

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidratada 10 g, Estreptomicina sulfato 10 g, Dexametasona fosfato 0.15 g, excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES

Porcinos: Actinomicosis, actinobacilosis, diarreas, salmonelosis, pasteurelosis, infecciones del cordón umbilical, neumonía, bronconeumonía y leptospirosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: Exclusivamente vía intramuscular profunda: 1 mL de AMOXIDES L.A.* / 10 kg p.v. En todas las etapas productivas.

De ser necesario repetir a las 48 horas.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 16 días.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



BRONCOX D

SOLUCIÓN INYECTABLE®

Combinación antibiótica de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato 5 g, Doxiciclina 20 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Tratamiento de ERC, neumonías, pleuroneumonías, agalactia contagiosa, pododermatitis, artritis, micoplasmosis, erisipela porcina, disentería porcina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: Vía intramuscular y subcutánea: 1 mL / 20 kg p.v. / día, por 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 14 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ciprofloxacina HCl 7.5 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, urogenitales y de la piel.

Porcinos: Neumonías, bronconeumonías, pleuroneumonías, diarreas, colibacilosis, pasteurelosis, Así como para el tratamiento de enfermedades genitourinarias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 mL / 20 kg p.v. / día, por 3 a 5 días vía EV.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

DOXIDROG INY®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Doxiciclina 10 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Está indicado en el tratamiento de procesos respiratorios como: neumonías, bronconeumonías y/o pleuroneumonías.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Solo vía intramuscular.

Porcinos: 1 mL de DOXIDROG INY® / 10 kg p.v./día, durante 3 – 5 días (equivalente a 10 mg de doxiciclina/kg p.v.).

PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ENRODROG®

Fluoroquinolona de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 100 mg, Excipientes Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Porcinos: Infecciones respiratorias como neumonías, complejo respiratorio porcino asociado a agentes sensibles (*Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*), gastrointestinales como diarrea neonatal y post destete en lechones por *E. coli*. MMA, mastitis por coliformes, artritis por *Mycoplasma hyosynoviae* e infecciones del tracto urinario.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: Administrar vía IM o SC: 1 mL de ENRODROG® / 40 kg p.v. / 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 10 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ENRODROG® 20

Fluoroquinolona de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 20 g, Excipientes Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Porcinos: Tratamientos de diarreas, colenterotoxemias, salmonelosis, pleuroneumonías, síndrome MMA y rinitis atrófica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 mL / 80 kg p.v. / 3 días, vía intramuscular.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

FOSFODROG T INY®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Fosfomicina sódica 100 mg, Trimetoprim 25 mg, Excipiente c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Porcinos: Neumonía enzootica, bronconeumonía, pasteurelosis, rinitis atrófica, pleuroneumonía, estreptococosis, colibacilosis, colisepticemia, síndrome mastitis metritis y agalactia (MMA), tifoidea, paratifoidea y artritis bacteriana.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 mL de FOSFODROG T INY® / 15 kg p.v. / día, 3 – 5 día por vía IM.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

FLORFENIDROG®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Florfenicol 300 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Indicado para infecciones causadas por bacterias gram positivas y negativas, como *Pasteurella* sp., *Haemophilus* sp., *Salmonella* sp., *Escherichia coli*, *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Clostridium* sp. y micoplasma. Tratamiento de neumonía y complejo respiratorio porcino.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 mL de FLORFENIDROG® / 30 kg p.v. vía intramuscular / día, por 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 28 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

OXIDROG INY

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina HCl 5 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Porcinos: Neumonías, septicemia hemorrágica, erisipela, metritis, mastitis, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta.

Porcinos: 1 mL / 10 kg / día / 3 a 5 días.

Intrauterino: 30 – 50 mL.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 18 a 21 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

OXIKETADROG L.A.®

Asociación antibiótica y
antiinflamatoria de larga acción



 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina base 200 mg, Ketoprofeno 30 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

OXIKETADROG L.A.® está indicado para la prevención y tratamiento de todos los procesos infecciosos con reacción inflamatoria, dolorosa y febril.

Porcinos: Neumonía, rinitis atrófica, enteritis bacteriana, leptospirosis, erisipela, onfalorritis, síndrome metritis-mastitis-agalactia (SMMA), heridas infectadas e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda o vía subcutánea.

Dosis única: 1 mL de OXIKETADROG L.A.® / 10 kg p.v. por día.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

OXIDROG L.A.®

Antibiótico de amplio espectro
y larga acción



 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina (base) 200 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Porcinos: Neumonías, septicemias, metritis, mastitis agalactia, paratífus, leptospirosis, enteritis bacterianas, onfalorritis, heridas infectadas y rinitis atrófica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía IM profunda en dosis única. De ser necesario repetir después de 3 días.

Porcinos: 1 mL / 10 kg p.v.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 28 días

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

AZ-DROG L.A.

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Azitromicina dihidrato 100 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Está indicado para el control y tratamiento de infecciones en lechones: Síndromes respiratorios: Infecciones respiratorias causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *P. multocida* o *M. hyopneumoniae*; neumonías, bronquitis y rinitis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via intramuscular. Dosis única o a criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda dividir la dosis y aplicarla en lugares separados, no debiéndose inyectar más de 20 mL por punto de aplicación.

Lechones: 1 mL /20 kg.p.v.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 40 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

CEFTIDROG®

Antibiótico de amplio espectro

 **Antibiótico** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ceftiofur sódico 50 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

CEFTIDROG® está indicado en infecciones del sistema respiratorio, urinario, óseo, piel y tejido blando, asociados a microorganismos susceptibles. Casos de Fiebre del embarque, neumonías, pododermatitis, metritis aguda, mastitis.

Porcinos: Destinado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana porcina (neumonía bacteriana porcina) asociada a *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 - 3 mL / 50 kg p.v. vía I.M.

Cada 24 horas durante 3 días continuos.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

SULFAMIX INY®

Antibiótico de amplio espectro



Antibiótico - Inyectable



COMPOSICIÓN

Sulfadimetoxina sódica 15 g, Sulfadiazina sódica 15 g, Trimetoprim 6 g, Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Porcinos: Colibacilosis (diarreas), pasteurellosis (neumonía bacteriana), coccidiosis, septicemias, rinitis necrótica y artritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Solo vía intramuscular.

Porcinos: 1 mL / 20 kg p.v. / día / 2 a 3 días, vía IM profunda.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 25 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

VITAMINAS

Líquidos

Polvos

AMINOVITADROG



Suplemento nutricional de aminoácidos y vitaminas

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 000 000 UI, Vitamina D3 1 000 000 UI, Vitamina E 3 000 UI, Ácido aspártico 10.4 g, Treonina 4.2 g, Serina 6.3 g, Ácido glutámico 9.3 g, Prolina 4.8 g, Glicina 4.9 g, Alanina 7.2 g, Cistina 1.7 g, Valina 8.4 g, Metionina 0.9 g, Isoleucina 1.6 g, Leucina 11.5 g, Tirosina 2.7 g, Fenilalanina 6.2 g, Triptófano 1.2 g, Lisina 8.2 g, Histidina 6.0 g, Arginina 4.5 g, Vehículo c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

Como activador del crecimiento, en casos de alimentación deficiente, carencias proteicas nutricionales, síndrome de mala absorción, convalecencia, estados de anorexia, desnutrición, estrés. Estimulante del crecimiento, lactancia, gestación, recuperador orgánico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 a 2 mL / L de agua, durante 5 o 7 días.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



AK STRESS®

Antiestrés y antihemorrágico

 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 12 000 000 UI, Vitamina K3 8 g, Metamizol 30 g, Ácido ascórbico 25 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

AK STRESS® está indicado para porcinos como:

Antihemorrágico en cuadros agudos de coccidiosis y hemorragias en general.

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones para aliviar la fiebre y el dolor.

Antiestrés por transporte, calor, aglomeraciones, vacunaciones, cambios en la alimentación, manejo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

En todas las etapas productivas.

1 mL de AK STRESS® / litro de agua, durante 3 a 5 días. Preparación diaria.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

COMPLIVIT B S.O.

Suplemento vitamínico

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 5 g, Vitamina B2 6 g, Vitamina B12 25 mcg, Niacina 16 g, Biotina 20 mg, Ácido fólico 250 mg, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 8 g, Vitamina K 2 g, Pantotenato de calcio 6 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

COMPLIVIT B S.O. está indicado en casos de intoxicación, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales, estados de tensión, estrés y debilidad en general. Favorece el crecimiento del animal y la fertilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 mL de COMPLIVIT B S.O. / kg p.v. durante 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

DROVIMIX 5

Suplemento vitamínico

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

Vitamina A 65 000 000 UI, Vitamina D3 7 000 UI, Vitamina E 50 UI, Vitamina C 100 mg, Biotina 10 mg, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

DROVIMIX 5 corrige problemas reproductivos, ayudando en la recuperación de los animales con toxemia por preñez, cetosis, aborto, retención de placenta y crías débiles.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

Porcinos

Lechones: 150 mL / 100 L de agua / 5 días.

Engorde: 100 mL / 100 L de agua / 3 días, cada 4 semanas.

Reproductores: 150 mL / 100 L de agua / 5 días, cada 4 semanas.

Marranas: 150 mL / 100 L / 5 días, 8 semanas antes y 4 semanas después del parto.

PRESENTACIÓN

100 mL y 1 L.

SAVIMDROG®

Vitaminas, aminoácidos y minerales

🔥 **Vitamina** - Líquido



COMPOSICIÓN

L-metionina 5 000 mg, Colina 1 500 mg, L-Islina 5 000 mg, Niacina 5 000 mg, Biotina (2%) 50 mg, Vitamina D3 600 000 UI, Vitamina B6 3 000 mg, Vitamina B12 2 mg, Ácido fólico 1 000 mg, Pantotenato de calcio 1 000 mg, Sulfato de manganeso 3 000 mg, Sulfato de magnesio 3 000 mg, Cloruro de potasio 25 000 mg, Cloruro de sodio 15 000 mg, Vehículos c.s.p. 1 000 mL

INDICACIONES

Como coadyuvante en terapias infecciosas y tóxicas, así mismo, en carencias proteicas, anomalías en la conformación estructural del esqueleto, dermatitis en patas y alrededor de los ojos, síndrome de hígado graso. Estados anémicos, síndrome de mala absorción, bajo crecimiento, reducción de la capacidad reproductiva, y gestación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 - 2 mL de SAVIMDROG® / L de agua / 5 - 7 días.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

CHEMI STRESS RC®

Complejo vitamínico
+ electrolitos

🔥 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 8 g, Vitamina B2 16 g, Vitamina B6 11.6 g, Vitamina B12 0.02 g, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 5 g, Vitamina K3 1 g, Niacina 10 g, Ácido fólico 2.8 g, Biotina 0.3 g, Pantotenato de calcio 47 g, Cloruro de sodio 217 g, Cloruro de potasio 34 g, Sulfato de magnesio 7 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

CHEMI STRESS RC® está indicado para porcinos. Recomendado para prevenir deficiencias vitamínicas. Indicado en casos de trastornos digestivos, trastornos respiratorios, intoxicaciones, reacciones post vacunales, retardo del crecimiento, dermatitis escamosa de las patas, estado de tensión o estrés por enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias y debilidad en general. Mejora la fertilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 100 g de CHEMI STRESS RC® / 200 litros de agua, por un período no menor a 4 días, a consideración del profesional tratante.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

Vitaminas

Líquidos
y Polvos



COMPLIVIT B

Suplemento vitamínico

 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 5 g, Vitamina B2 6 g, Vitamina B12 25 mcg, Niacina 16 g, Biotina 20 mg, Ácido fólico 250 mg, Vitamina C 5 g, Vitamina D3 8 g, Vitamina K 2 g, Pantotenato de calcio 6 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

COMPLIVIT B está indicado en casos de intoxicación, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales, estados de tensión, estrés y debilidad en general. Favorece el crecimiento del animal y la fertilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida

Porcinos: 1 g de COMPLIVIT B / kg p.v. durante 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.



DROGAVIT E®

Multivitamínico + electrolitos

 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 5 000 000 UI, Vitamina D3 500 000 UI, Vitamina E 300 UI, Vitamina B1 2 g, Vitamina B2 5 g, Vitamina B6 3 g, Vitamina B12 0.025 g, Vitamina C 20 g, Vitamina K 12 g, Niacina 5 g, D-Pantotenato de calcio 5 g, Ácido fólico 0.2 g, Sulfato de magnesio 7 g, Cloruro de sodio 170 g, Cloruro de potasio 34 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

DROGAVIT E® contrarresta el estrés durante enfermedades, procesos vacunales, traslados, cambios de clima. Refuerza la función hepática y restituye la pérdida de líquidos corporales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Via oral en el agua de bebida.

Porcinos: 100 g de DROGAVIT E® en 200 litros de agua.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

ELECTRESS D®

Complejo vitamínico

 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 10 000 000 UI, Vitamina D3 2 000 000 UI, Vitamina E 3000 UI, Vitamina B6 2 g, Vitamina B12 10 mg, Vitamina C 20 g, Vitamina K 5 g, Ácido fólico 5 g, Pantotenato de calcio 250 mg, Sulfato de magnesio 7.7 mg, Cloruro de potasio 37 g, Cloruro de sodio 238 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

ELECTRESS D®, está indicado en porcinos para contrarrestar los estados de estrés ocasionados por procesos vacunales, traslado, cambios de clima y ventilación deficiente. Facilita la recuperación de los animales luego de procesos febriles y de deshidratación. Actúa como coadyuvante en el tratamiento de infecciones respiratorias, coccidiosis, enteritis, parasitosis y micotoxicosis. Estimula el crecimiento y mejora la asimilación alimenticia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 1 g de ELECTRESS D® / litro de agua.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

HEPA VIT

Antitóxico, lipotrópico
y protector hepático

 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina B1 10 g, Vitamina B2 18 g, Vitamina B6 12 g, Vitamina B12 0.015 g, Ácido fólico 2.8 g, Ácido orótico 2.5 g, Pantotenato de calcio 47 g, Excipiente c.s.p. 1 000 g

INDICACIONES

Está recomendado para porcinos como protector hepático, desintoxicante y lipotrópico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 100 g de HEPA VIT / 200 L de agua o 50 mg de HEPA VIT / kg p.v., durante 2 – 3 días.

PRESENTACIÓN

100 g y 1 kg.

VITA VET PLUS

Suplemento vitamínico

 **Vitamina** - Polvo



COMPOSICIÓN

Vitamina A 5, 000 000 UI, Vitamina D3 1000 000 UI, Vitamina E 5000 UI, Vitamina K3 1 g, Tiamina 1 g, Riboflavina 3 g, Niacina 2 g, Pantotenato de calcio 8 g, Piridoxina 1 g, Biotina 0.05 g, Ácido fólico 1.25 g, Vitamina B12 20 mg, Metionina 50 g, Sulfato de magnesio 7 g, Cloruro de sodio 75 g, Cloruro de potasio 25 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Suplemento multivitamínico y mineral indicado para la prevención y tratamiento de avitaminosis, alteraciones del metabolismo mineral y baja disponibilidad de vitaminas en animales jóvenes. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias, afecciones hepáticas, intoxicaciones, micotoxinas, estados de estrés y distrofias óseas como raquitismo, osteomalacia y cojera.

Estimula el crecimiento, ganancia de peso y la fertilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 100 g de **VITA VET PLUS** /200 litros de agua o 1 g de **VITA VET PLUS** / 2 litros de agua, durante 3 – 5 días continuos.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

DESINFECTANTES

Líquidos

Polvos



CITRIDROG L®

Desinfectante orgánico, acidificante y promotor

Desinfectante - Líquido

COMPOSICIÓN

Ácido cítrico 10%, Ácido ascórbico 11%, Ácido láctico 9%, Ácido acético 9%, Aceite de limón 2%, Aceite de naranja 1%, Vehículo c.s.p. 1000mL

INDICACIONES

- Recomendado para porcinos en todas las etapas productivas.
- Acidificante y promotor de crecimiento, previene la proliferación de microorganismos nocivos para la flora intestinal favoreciendo la salud e integridad del tracto digestivo del animal.
- Por su actividad antioxidante actúa como protector de las vitaminas liposolubles durante la preparación y almacenaje de los alimentos.
- Desinfectante de superficies, equipos, instalaciones en presencia de cerdos.
- Sanitizante para reducir la carga microbiana de insumos y productos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Desinfectante:

De 3 a 5 mL de CITRIDROG L® / litro de agua según la carga bacteriana.

Desinfección intermedia: 1 a 3 minutos de contacto

Desinfección alta: 5 a 10 minutos de contacto.

Promotor de crecimiento: 250 - 500 mL de CITRIDROG L® / tonelada de alimento según edad, especie y producción.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



DROYOVET®

Yodóforo de amplio espectro

Desinfectante - Líquido

COMPOSICIÓN

Yodo povidona 10 %, Ácido cítrico 9.6 %, Fosfato disódico 2.68 %, Ácido fosfórico 0.9 %, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

DROYOVET® está indicado para limpiar, desinfectar y desodorizar ambientes abiertos o cerrados (con o sin presencia de animales) que presentan una alta carga microbiológica contaminante. DROYOVET® es un producto atóxico y no irritante utilizado en la dosis indicada, también puede ser usado en termo fumigación.

MODO DE USO

- Potabilización de agua de bebida: 100 mL / 200 L de agua.
- Desinfección de hospitales y recintos relacionados: 600 a 666 mL / 200 L de agua.
- Desinfección de galpones, plantas y ganadería: 625 mL / 200 L de agua.
- Uso tópico en heridas, cortes en lechones y gorrinos: 10 mL / L de agua.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

GLUTALTEK 2/3®

Asociación de amplio espectro
y rápida acción

💧 **Desinfectante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 200 mL, Amonio cuaternario 300 mL, Solvente especial c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Desinfección de:

- Equipos e instalaciones pecuarias.
- Pediluvios como tapete sanitario.
- Vehículos de transporte de agua, alimento.

MODO DE USO

2 a 4 mL de GLUTALTEK 2/3® / litro de agua. Según el grado de contaminación. Aplicar mediante aspersión o inmersión.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

KRESO ALEMÁN

Limpieza y desinfección de instalaciones pecuarias

💧 **Desinfectante** - Líquido

COMPOSICIÓN

Creosota 33%, Emulsificante 14%, Agua desionizada 53%

INDICACIONES

Limpieza y desinfección de instalaciones pecuarias, industria de productos alimenticios lácteos, cárnicos y vegetales. Industrias de agroexportación, restaurantes y hospitales.

MODO DE USO

- Para la limpieza doméstica de pisos, paredes, azulejos, duchas: Diluir 4 litros de KRESO ALEMÁN en 200 litros de agua.
- Para la desinfección de baños públicos, restaurantes, hoteles, hospitales: Diluir 60 mL (6 cucharadas) de KRESO ALEMÁN en un litro de agua.
- En establos, industrias de conservas, granjas, clínicas veterinarias: Diluir 80 mL (8 cucharadas) de KRESO ALEMÁN en un litro de agua.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.





VINADROG

Acidificante y removedor de sarro

💧 **Desinfectante** - Líquido

COMPOSICIÓN

Ácido acético 5 %, Vehículo c.s.p. 100 %

INDICACIONES

VINADROG está indicado en explotaciones pecuarias de porcinos como acidificante del agua de bebida, así como para la limpieza y desinfección de los sistemas de agua.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Acidificante de agua de bebida: 2 mL de VINADROG / litro de agua.
Para limpieza de tuberías y sarro: 25 mL de VINADROG / litro de agua.

PRESENTACIÓN

1 L, 20 L y 210 L.



D.A-CIDROG

Detergente ácido para lavado profundo y desincrustación líquido

💧 **Desinfectante** - Líquido

COMPOSICIÓN

Ácido láctico 50 g, Ácido acético 100 g, Ácido fosfórico 11 g, Cloruro de benzalconio 200 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Lavado de tuberías, equipos e instalaciones agropecuarias (galpones, jaulas, jabas, pisos, sistema de circulación de agua de PVC o acero inoxidable).

MODO DE USO

- **Lavado superficies:** 5 a 10 mL de D.A-CIDROG por litro de agua.
- **Desincrustación de tuberías:** Dilución de 2 - 6% de D.A-CIDROG dependiendo del estado y frecuencia de limpieza de las tuberías.
- Llenar la tubería con la dilución recomendada, luego sellar la entrada y salida.
- Dejar actuar de 15 a 30 horas.
- Luego conectar al agua, evacuar y enjuagar las tuberías hasta que no salga agua espumosa.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL , 1 L, 5 L y 20 L.

CITRIDROG®

Aditivo prebiótico, promotor de crecimiento, desinfectante, sanitizante



Desinfectante - Líquido



COMPOSICIÓN

Ácidos orgánicos 39 %, Extractos cítricos 3 %, Excipientes c.s.p. 58 %

INDICACIONES

- Acidificante y promotor de crecimiento.
- Desinfectante para espolvorear en camas en presencia de seres vivos.
- Sanitizante para bajar carga microbiana de insumos y productos.
- Aditivo antioxidante para alimentos que previene la rancidez.
- Protector y estabilizante de vitaminas liposolubles durante la preparación y almacenaje de alimento.
- Desinfectante de cama a razón de 20 – 25 g cada 15 días.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: En todas las etapas productivas.

• Sanitizante

Alimento peletizado: 1 – 2 kg de CITRIDROG® / T de alimento.

Alimento en polvo: 2 – 3 kg de CITRIDROG® / T de alimento.

Ingredientes: 2 – 4 kg de CITRIDROG® / T de alimento.

• Promotor de crecimiento

Primera semana: 500 g de CITRIDROG® / T de alimento.

A partir de la segunda semana: 250 g de CITRIDROG® / T de alimento.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

NATURALES

Líquidos

Polvos

EM-DROG

Probiótico – deodorizante

 **Natural** - Líquido



COMPOSICIÓN

Microorganismos eficaces 50×10^7 UFC, Silicatos fosfizados 20 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

- Probiótico.
- Promotor de crecimiento
- Mantiene la integridad intestinal por exclusión con los patógenos por el sustrato.
- Control de malos olores en camas (amoníaco).

DOSIFICACIÓN

Porcinos: 0.5 mL de EM-DROG / L de agua de bebida; según programa de acuerdo a la necesidad propia de la granja.

Instalaciones pecuarias (camas): 1 L de EM-DROG / 20 L de agua para 250 m² de superficie.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

INMUNO E PIG S.O.

Inmunoestimulante natural

 **Natural** - Líquido



COMPOSICIÓN

Extracto de *Echinacea purpurea* 50 g, Extracto de sauco (elderberry) 25 g, Extracto de cardo mariano 25 g, Excipientes c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Tratamiento coadyuvante de enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos:

1 mL de INMUNO E PIG S.O. / L de agua constante, durante 7 - 14 días.

1 mL de INMUNO E PIG S.O. / 10 kg p.v. / día, durante 7 - 14 días.

0.1 mL de INMUNO E PIG S.O. / kg p.v. / día, durante 7 - 14 días.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



SILYDROG®

Suplemento natural antitóxico

 **Natural** - Líquido



COMPOSICIÓN

Silimarina 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

SILYDROG® está recomendado en porcinos para prevenir y/o disminuir el daño hepático causado por:

- Toxinas en alimentos.
- Medicamentos.
- Productos químicos.
- Enfermedades bacterianas, fúngicas o virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

1 mL de SILYDROG® / 10 kg p.v. o 0.1 mL de SILYDROG® / kg p.v. o 0.5 L de SILYDROG® / 1000 L de agua de bebida constante hasta la desaparición de los signos clínicos o por siete días cada mes.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

SINDROG S.O.

Salud Intestinal Natural

 **Natural** - Líquido



***REGISTRO EN TRÁMITE**

COMPOSICIÓN

Bacterias acidófilas y levaduras 18×10^7 UFC, Péptidos 125 g, Caolín 150 g, Pectina cítrica 4 g, Anís 2 g, Vehículos c.s.p. 1.000 mL

INDICACIONES

Tratamiento o prevención de problemas gastrointestinales. Actúa mejorando el equilibrio adecuado del tracto gastrointestinal y promoviendo una mejor respuesta en los parámetros productivos, enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en agua de bebida.

Tratamiento: 1 mL / L de agua por 5 a 7 días.

Promotor: 0.25 a 0.5 mL / L de agua en forma continua según etapa productiva y a criterio del Médico Veterinario tratante.

PRESENTACIÓN

1 L, 5 L y 20 L.



EM-DROG P

Probiótico – deodorizante

 **Natural** - Polvo



COMPOSICIÓN

Microorganismos eficaces 40×10^6 UFC, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

- Probiótico.
- Mejora la disponibilidad de los nutrientes, el metabolismo de las grasas, la conversión alimenticia, la ganancia de peso previene el hígado graso.
- Mejora la calidad de la cáscara de huevo.
- Control de moscas y otros insectos (larvas y adultos) como *Alphitobius* spp, en los residuos orgánicos.
- Control de la humedad y los malos olores de las camas (amoníaco).

DOSIFICACIÓN

Porcinos: 0.5 kg de EM-DROG P / T de alimento.

PRESENTACIÓN

10 kg, 15 kg, 20 kg.

SILYDROG®40

Compuesto natural antitóxico

 **Natural** - Polvo



COMPOSICIÓN

Silimarina 400 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

SILYDROG®40 se recomienda para todas las especies, para prevenir y/o disminuir el daño hepático causado por:

- Toxinas en alimentos.
- Medicamentos.
- Productos químicos.
- Enfermedades bacterianas, fúngicas o virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía oral, en el alimento.

Porcinos: 0.125 kg de SILYDROG®40 / tonelada de alimento, hasta la desaparición de los signos clínicos o por 7 – 10 días cada mes como protector hepático.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

INMUNO E PIG

Imunoestimulante, antitóxico y antioxidante natural

 **Natural** - Polvo



COMPOSICIÓN

Extracto de Echinacea purpurea 50 g, Extracto de sauco 25 g, Extracto de cardo mariano 25 g, Excipiente natural c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Tratamiento coadyuvante de enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico. Es además, antitóxico y antioxidante natural, activador regenerativo hepático, colerético y colagoga.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Porcinos: De 1 - 2 kg de INMUNO E PIG / T de alimento, durante 7 - 14 días.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

SINDROG

Salud Intestinal Natural

 **Natural** - Polvo

*REGISTRO EN TRÁMITE



COMPOSICIÓN

Bacterias acidófilas y levaduras 18×10^7 UFC, Péptidos 125 g, Caolín 263 g, Pectina cítrica 8 g, Anís 4 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES

Tratamiento o prevención de problemas gastrointestinales. Actúa mejorando el equilibrio adecuado del tracto intestinal, y promoviendo una mejor respuesta en los parámetros productivos, enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

Tratamiento: 1 kg / T de alimento por 14 a 21 días.

Promotor: 0.5 kg / T de alimento en forma continua según etapa productiva y a criterio del Médico Veterinario tratante.

PRESENTACIÓN

15 Kg y 20 Kg.

EXPECTORANTES

Líquidos



ESPECTODROG®N

Expectorante mucolítico

💧 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina 5 g, Guaifenesina 30 g, Eucaliptol 80 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Se indica en porcinos sólo o en combinación con antibióticos, contra enfermedades o síndromes respiratorios en los que el daño del aparato mucociliar degenera en la producción excesiva de moco viscoso, son algunos ejemplos que motivan su prescripción médica.

DOSIFICACIÓN

Porcinos: En todas las etapas productivas.

Nebulización: 500 mL de ESPECTODROG®N / mochila de agua de 20 litros durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía oral en toma directa: 10 mL / animal / día, por 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ESPECTODROG®PLUS

Expectorante, mucolítico y antihistamínico

💧 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina clorhidrato 5 g, Eucaliptol 10 g, Clorfeniramina maleato 10 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Tratamiento de síndromes respiratorios, enfermedades respiratorias, como coadyuvante en tratamiento con antibióticos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

En todas las etapas productivas: Vía oral en toma directa: 10 mL / animal / día, por 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

ESPECTODROG®



Expectorante mucolítico

💧 **Expectorante** - Líquido



COMPOSICIÓN

Bromhexina clorhidrato 5 g, Eucaliptol 10 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Tratamiento de síndromes respiratorios, enfermedades respiratorias como coadyuvante en tratamiento con antibióticos.

DOSIFICACIÓN

En todas las etapas productivas.

Vía oral en toma directa: 10 mL / animal / día, por 3 a 5 días.

PRESENTACIÓN

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

ANTIDIARREICO

**ANALGÉSICO Y
ANTIPIRÉTICO**

Líquidos

**CONTROL DE
MOSCAS**

**SALUD
INTESTINAL**

**ANTIPARASITARIO
ENDECTOCIDA**

Polvos

DIAEROM-PLUS

Antidiarreico no antibiótico



💧 **Antidiarreico** - Líquido



COMPOSICIÓN

Caolín 200 g, Pectina 4.4 g, Esencia de anís 2.0 g, Agua desionizada c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

DIAEROM-PLUS está indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis inespecíficas de los animales. Puede administrarse solo o como coadyuvante en el tratamiento con antibióticos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, en el agua de bebida.

Porcinos: Administrar en toma directa de 90 a 120 mL de DIAEROM-PLUS / animal cada 2 a 3 horas, hasta que ceda el proceso diarreico.

PRESENTACIÓN

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

ASPIDROG® S.O.

Analgésico y antipirético



💧 **Analgésico y antipirético** - Líquido

COMPOSICIÓN

Paracetamol 250 g, Metamizol 50 g, Ácido ascórbico 25 g, Vitamina A 3 g, Vehículos c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES

Tratamiento de síntomas febriles y dolencias de diversas patologías.

Terapia de soporte en afecciones bacterianas o virales, estrés por calor y aglomeraciones por transporte o hacinamiento.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida.

Porcinos: 0.75 mL de ASPIDROG® S.O. / 10 kg p.v. 2 veces al día hasta que cesen los síntomas o a criterio del Médico Veterinario tratante.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.





LARVADROG®

Aditivo alimenticio para el control de moscas y pulgas



▲ Control de moscas - Polvo

COMPOSICIÓN

Ciromazina 100 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Control y exterminio de larvas, moscas y pulgas en la cama de las gallinas ponedoras, comerciales y reproductoras.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado con el alimento
500 g de LARVADROG® / tonelada (5ppm) durante seis semanas seguidas. Suspender por el mismo lapso de tiempo y repetir este proceso de manera sucesiva

PERIODO DE RETIRO

Aves: 3 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

1 kg y 25 kg.



RANDROG PIG

Salud intestinal

▲ Salud intestinal - Polvo



COMPOSICIÓN

Ranitidina HCl 200 g, Bacterias acidófilas 20×10^4 UFC, Caolín 263 g, Pectina cítrica 8 g, Anís 4 g, Vitamina E 22.5 UI, Selenito de sodio 0.055 g, Bicarbonato de sodio 10 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

RANDROG PIG está indicado para porcinos en la prevención o tratamiento de gastritis, úlceras y promueve una mejor respuesta a enfermedades bacterianas, virales o fúngicas.

Factores estresantes como el aumento de la densidad de animales; poca disponibilidad de agua o comida; y fluctuación de las temperaturas ambientales o transporte.

Deficiencias de vitamina E o selenio.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

A razón de 1 Kg de RANDROG PIG / T de alimento / 14 - 21 días.

PRESENTACIÓN

10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

IVERDROG-P12

Antiparasitario endectocida

 **Antiparasitario** - Polvo



COMPOSICIÓN

Ivermectina 12 g, Excipiente c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de nemátodos gastrointestinales, renales y pulmonares, piojos y ácaros de la sarna de cerdos en crecimiento, reproducción y sementales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis general: 100 microgramos de Ivermectina por kilo de peso vivo durante 7 días consecutivos.

Cerdos etapa inicio: 140 g de Iverdrog P12 / T alimento.

Cerdos etapa crecimiento (60 Kg p.v.): 215 g de Iverdrog P12 / T alimento.

Cerdos etapa acabado (90 Kg p.v.): 250 g de Iverdrog P12 / T alimento.

Cerdos verracos, cerdas reproductora (200 Kg p.v.): 340 g de Iverdrog P12 / T alimento.

PERIODO DE RETIRO

Cerdos: 7 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

IVER DROG

Antiparasitario

 **Antiparasitario** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ivermectina 1 g, Cianocobalamina 30 mcg, Vehículo estéril c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Antiparasitario inyectable para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas en porcinos, contiene vitamina B12 para la recuperación de estados de anemia y convalecencia por parasitosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis única / vía SC.

Porcinos: 1 mL / 33 kg p.v.

En casos de sarna: Repetir a los 10 o 14 días, a criterio del Médico Veterinario.

Dosis mayores a 10 mL, dividir en dos puntos de aplicación.

parásitos externos: repetir tratamiento a los 21 días.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 19 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Antiparasitario

Polvos y
Inyectables



IVERDROG 1.5®

Antiparasitario endectocida

 **Antiparasitario** - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ivermectina 1.5 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Antiparasitario inyectable para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas en:

Porcinos:

Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp. y *Strongyloides ramsoni*.

Parásitos pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Parásitos renales: *Stephanurus dentatus*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía subcutánea en dosis única.

Porcinos: 1 mL / 50 kg p.v. (equivalente 0.3 mg de ivermectina / kg p.v.).

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 19 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



ANABÓLICO

Inyectable

BOLDEDROG®

Anabólico de acción prolongada



Anabólico - Inyectable



COMPOSICIÓN

Undecilenato de boldenona 50 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Incremento de masa muscular en animales de engorde. Coadyuvante en tratamiento de enfermedades tipo consuntivo, anemia, raquitismo, parasitosis y fracturas. Estrés por destete, procesos postquirúrgicos y castración.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Porcinos: 1 mL de BOLDEDROG® / 90 kg p.v.

En animales de engorde para mejores resultados, repetir la dosis a las 4 semanas.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 71 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

SUPLEMENTOS

Inyectables

ADE DROG®

Suplemento vitamínico de alta concentración



Suplemento - Inyectable

COMPOSICIÓN

Vitamina A (Palmitato retinol) 500 000 U.I., Vitamina D3 (Colecalciferol) 75 000 U.I., Vitamina E (Alfa-tocoferol) 50 U.I., Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

En deficiencias vitamínicas, desórdenes metabólicos, mejorando parámetros de producción y reproductivos (fertilidad, gestación y lactancia), trastornos del crecimiento e hipocalcemia. Favorece la recuperación en casos de infecciones digestivas, respiratorias y oculares.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía IM profunda o SC. Dosis por animal:

Porcinos: 1 – 3 mL.

Lechones: 0.5 – 1 mL.

Se recomienda repetir dosis cada 3 o 4 meses.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



DROGVIT B®

Suplemento vitamínico



Suplemento - Inyectable

COMPOSICIÓN

Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) 10 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 2 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida) 50 mg, Vitamina B5 (Pantotenato de calcio) 5 mg, Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 10 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 50 µg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

En deficiencias de vitamina B, trastornos (neuromusculares, metabólicos y hematopoyéticos), anemias, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, enfraquecimiento, debilidad, Inapetencia y agotamiento sexual. Estimulante del apetito, crecimiento y producción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Porcinos:

2 a 10 kg p.v.: 1 mL / 2 o 3 días.

10 a 20 kg p.v.: 2 mL / 2 o 3 días.

20 a 50 kg p.v.: 5 mL / 2 o 3 días.

50 a 100 kg p.v.: 10 mL / 2 o 3 días.

Dosis a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



HIERRODROG-12 20%®

Vitaminico mineral



Suplemento - Inyectable



COMPOSICIÓN

Hierro dextrano 200 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 100 µg, Vehículo estéril c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la anemia causada por deficiencia de hierro y vitamina B12 común en animales jóvenes, hemorragias, diarreas y parasitosis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda. Repetir a los 7 días.

Lechones:

Preventivo: 1 mL por animal entre el 2do y 4to día de vida.

Tratamiento: 1 mL por animal.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

VIGORDROG®

Reconstituyente y estimulante del crecimiento

Suplemento - Inyectable



COMPOSICIÓN

Triptófano 2.5 mg, Histidina 5 mg, Metionina 10 mg, Lisina 10 mg, Ácido cítrico 5 mg, Tiamina clorhidrato 5 mg, Riboflavina 2 mg, Nicotinamida 50 mg, Vitamina B12 15 mcg, Piridoxina clorhidrato 10 mg, Hierro (Citrato amoniacal) 20 mg, Cobalto 0.5 mg, Cacodilato de sodio 30 mg, Glicerofosfato de sodio 20 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Anemia, trastornos del metabolismo y hematopoyesis, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, enflaquecimiento, debilidad, inapetencia, fracturas, intoxicaciones y agotamiento sexual. Estimulante del apetito, crecimiento y producción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía IM profunda, SC o EV lenta.

Porcinos: de 2 – 10 kg p.v.: 1 mL/2 o 3 días; de 10 a 20 kg p.v.: 2 mL / 2 o 3 días; de 20 a 50 kg p.v.: 5 mL / 2 o 3 días; de 50 a 100 kg p.v.: 10 mL/2 o 3 días.

Dosis según criterio del Médico Veterinario tratante.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

ANTIINFLAMATORIOS

Inyectables

DEXADROG®

Antiinflamatorio de acción prolongada



Antiinflamatorio - Inyectable



COMPOSICIÓN

Dexametasona 21 – fosfato sódico 150 mg, Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

- Procesos inflamatorios en general, por enfermedades respiratorias y del sistema músculo – esquelético, patologías de la glándula mamaria y traumatismos.
- Alergias por medicamentos, dermatitis alérgica, picaduras de insectos y eczemas.
- Trastornos metabólicos, inducción del parto.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular.

Porcinos: 0.01 – 0.07 mL de DEXADROG® / kg p.v. / día, de 2 a 3 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 21 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

FLUNIDROG®

Analgésico, antipirético



Antiinflamatorio - Inyectable



COMPOSICIÓN

Flunixin meglumina 50 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio para el tratamiento de desórdenes músculo-esqueléticos como cojeras, artritis, tendinitis, control de pirexia, síndrome MMA de porcinos; tratamiento adyuvante en infecciones bacterianas y endotoxemia como en casos de enfermedad respiratoria aguda, mastitis por coliformes con shock endotóxico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis y vías de administración según especies:

Porcinos: 2.2 mL / 50 kg p.v. / día, vía IM como dosis única.

PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 21 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

KETODROG®

Potente antiinflamatorio no esteroideo



Antiinflamatorio - Inyectable



COMPOSICIÓN

Ketoprofeno 100 mg, Vehículo c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado en el tratamiento de condiciones inflamatorias y dolorosas en articulaciones y músculos. Coadyuvante en la terapia antibiótica de procesos respiratorios y de la glándula mamaria que impliquen inflamación, fiebre o dolor.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Porcinos: 1 mL de KETODROG® / 33 kg p.v. por día, durante 1 a 3 días consecutivos vía IM profunda.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 4 días.

*Depende la reglamentación de cada país.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



PROXIMAMENTE

Polvo

Injectable



RANDROG INY

Antiácido - Antiulceroso

 **Antiinflamatorio** - Inyectable

***PRODUCTO EN DESARROLLO**



COMPOSICIÓN

Ranitidina HCl 20 mg, Vehículo estéril c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Tratamiento de úlcera duodenal.

Prevención de la aparición de úlceras por estrés.

Administración prolongada de AINES (Antiinflamatorios no esteroides.)

Para evitar la reaparición de hemorragias digestivas.

Para combatir y regular el síndrome neoplásico producido por el tumor de mastocitos.

Síndrome de reflujo gastroesofágico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular o endovenosa: 1 mL RANDROG INY / 10 kg p.v. cada 12 horas hasta remisión de los síntomas.

Fluidoterapia: administrar vía endovenosa en goteo continuo, debido a que puede inducir al vómito.

PRESENTACIÓN

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



OMEDROG PIG

Salud Intestinal

 **Salud Intestinal** - Polvo

***PRODUCTO EN DESARROLLO**



COMPOSICIÓN

Omeprazol 20 g, Bacterias acidófilas 18×10^7 UFC, Caolín 263 g, Peptina cítrica 8 g, Anís 4 g, Vitamina E 22.5 UI, Selenito de sodio 0.055 g, Bicarbonato de sodio 10 g, Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES

OMEDROG PIG está indicado en el tratamiento de gastritis y lesiones intestinales como úlceras provocadas por disturbios alimenticios o deficiencias de manejo como:

- Dietas con baja proteína o con poca fibra o con alta energía.
- Deficiencias de vitamina E o selenio.
- Dietas con alto cobre (especialmente si están bajos en zinc).
- Dietas con niveles altos de grasas insaturadas.
- Tamaño de la partícula de pienso (< 400 μ m): cuanto más molida esté la harina más pequeño llega a ser el tamaño de la partícula y mayor es la incidencia de úlceras.
- Aumento de la densidad de animales y movimiento de cerdos o excesiva agresión.
- Mal manejo de las cerdas en jaulas y atadas.
- Alimentación irregular, falta de espacio de comedero.
- Periodos de hambre.
- Poca disponibilidad de agua o comida.
- Fluctuación de las temperaturas ambientales o transporte.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el alimento.

A razón de 1 kg / T de alimento por 7 a 14 días.

PRESENTACIÓN

15 kg y 20 kg.



► Conoce todos nuestros productos entrando a:
www.laboratoriosdrogavet.com.pe

Av. Los Cóndores Mz. K, El Club 1era. Etapa, Santa María de Huachipa, Lurigancho. Lima - Perú.
Central: (511) 371-0390, Anexo 105 | Email: ventas@grupodrogavet.com / Cel. 981010251
Web: www.grupodrogavet.com

